

REAL ACADEMIA GALEGA

AVANZOS NO COÑECIMENTO
DA XEOMORFOLOXIA DE GALICIA

DISCURSO

lido no acto da súa recepción

por

D. UXÍO TORRE ENCISO

e

RESPOSTA

do Académico Numerario

Dr. D. ISIDRO PARGA PONDAL

o día 24 de Outono de 1970



A CRUÑA

1970

EMIA
A
ÑA


42

eca

REAL ACADEMIA
GALEGA
A CORUÑA

29442

Biblioteca



REAL ACADEMIA GALEGA

AVANZOS NO COÑECIMENTO
DA XEOMORFOLOXIA DE GALICIA

DISCURSO

lido no acto da súa recepción

por

D. UXÍO TORRE ENCISO

e

RESPOSTA

do Académico Numerario

Dr. D. ISIDRO PARGA PONDAL

o día 24 de Outono de 1970



Biblioteca



A CRUÑA

1970

Depósito legal: C-524-1970

As meus queridos e cultos compatriotas, En-
rique Chao Espina, unha forte aperta

E. Torre Enciso

DISCURSO

de

Don Uxío Torre Enciso

1890

1891

1892

Ilustrísimo Señor Presidente,

Señores Académicos:

Sexan estas primeiras verbas pra testemoñar a miña fonda gratitude aos señores membros da douta Corporación que me acolle hoxe no seu seo constituída por esgrevios cultivadores das Cencias e das Letras galegas, e que chamándome á súa beira deron boa mostra da máis grande bondosía. Un sentido recordo desexo adicar tamén a aqueles inesquecibles profesores da Universidade de Santiago de Compostela que impelíronme ao estudo das Cencias Naturaes, e igualmente aos que máis tarde introduxéronme no campo da Xeoloxía. O meu pensamento céntrase de xeito especial nos profesores doutores Don Lois Iglesias Iglesias e Don César Sobrado y Maestro, cadeirádegos respectivamente das Facultades de Cencias e de Farmacia da referida Universidade, o primeiro, membro de número desta Real Academia, o segundo hai tempo falecido, i entrambos universitarios de moita sona. Eles me forneceron dos coñecimentos básicos de Xeoloxía e de Bioloxía que posibilitaron a miña adicación ulterior ao ensino das Cencias Naturaes. É moito tamén o que debo, tocante da miña formación na Xeoloxía, ao doutor Don Isidro Parga Pondal, o meu antigo profesor de Química Analítica na Facultade de Cencias de Santiago e académico de número desta Corporación, ben coñecido dentro e fora de España polo seu inxente aportamento á conecencia xeolóxica de Galicia, e ao doutor e inxenheiro de minas Don Xoán Manoel López Azcona, membro correspondente desta Academia e relevante figura do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, cuas investigacións xeolóxicas i espeutrográficas son asimesmo largamente coñecidas. Sabidores da miña afeizón á Xeoloxía, tiveron a bondade de deixarme colaborar con eles. A todos esprimolles neste intre o meu sinceiro agradecimento.

* * *

Tivéchedes a xenerosidade de nomearme pra ocupar un posto valeiro dende o 15 de Abril de 1965, data na que tivo lugar o óbito do distinto

membro de número desta Real Academia Don Xulio Sigüenza Raimúndez, cuxa morte foi tan sentida no ámeto de toda Galicia e sen dúbida tamén polos galegos de alenmar. Láíome de non posuir a axeitada preparación pra millor espór a meritoria laboura literaria deste prestixioso escritor e xornalista galego, que espállase non samente no campo do xornalismo —que exercéu con intensidade moitos anos dentro e fora de España— senón aínda noutros dominios das letras, como son a novela, a poesía e o ensaio. Dono dunha larga cultura, que debéu en grande medida á súa longa estada nas Américas, bó coñecedor das correntes inteleituas dos seus tempos, por mor dos estreitos contaitos mantidos, dende moi novo, cos ambientes máis cultos das diferentes terras onde moróu; fornecido, por outra banda, dunha esquisita sensibilidade que espéllase no fondo e na forma da súa obra literaria, afatóu as condicións ideaes pra o cultivo da literatura e da crítica literaria e do arte, e pra o exercicio da dificultosa profesión xornalística que simultaneóu coas outras aitividades. Tentaréi, no que segue, facer unha curta sembranza de Don Xulio Sigüenza.

Nado na Cruña o 7 de Xaneiro de 1898 onde decorre a súa infancia, vai a Cuba aos catorce anos, e aínda moi novo, publica aló os seus primeiros poemas e artigos nos xornaes de Hispanoamérica. Máis tarde, tras unha rápida visita á Cruña, trasládase a Buenos Aires, traballando pra “La Razón” e outros importantes diarios, dirixe a revista “Céltiga”, e distínguese tamén como conferenciante. En data posterior vai a Montevideo, pasando a ocupar o cargo de segredario do Centro Galego, e vémolos dirixir a revista “Galicia”, editada por aquela prestixiosa Entidade, e máis “Cartel”, unha revista de Arte. Con outro esgrevio cruñés, o doutor Don Constantino Sánchez Mosquera, naquel intre presidente do referido Centro, funda na capital uruguáa a “Asociación Protectora de la Cultura Gallega”, que orgaizou o Certame galego-americán de 1929, emprestando así un relevante servizo á causa da nosa cultura.

A lembranza da terra que sempre sentira faille tornar en 1931 aos eidos queridos, e destácase axiña no xornalismo galego, ao que apricóuse afervoadamente. En 1932 ocupa xa o cargo de redaitor-xefe de “El Pueblo Gallego” de Vigo, e dirixe tamén “La Tarde” de aquela cidade, a máis das revistas “Cartel” e “Númen” de poesía. Colabora en “La Voz de Galicia” e noutros periódicos da rexión, e traballa como corresponsal pra diversos diarios hispanoamericáns. Máis tarde, vencéllase como redaitor a “El Faro de Vigo”, onde ao longo de quince anos, publica infindos artigos, traballos de crítica de arte e outros encol da aitualidade internacional. Nesta

tarefa, e sendo vicepresidente da Asociación da Prensa de Vigo, sorpréndelle a morte.

Durante máis de 35 anos Don Xulio Sigüenza residira en Vigo, e foi nesta cidade onde fundou un fogar e naceron os seus fillos.

A súa aitividade xornalística foi, sen dúbida, escelzoal, mais a capacidade de traballo consintéulle afrontar con éisito a poesía e outros ramos das letras, e compre sulñar que publicou un bó quiñón dos seus escritos en galego, idioma do que tiña un fondo coñecimento.

Esculquemos primeiramente na súa obra poética. No ano 1924, moi xoven aínda, emprenta na Habana o seu primeiro libro de poesías tiduado "De los agros celtas", en cuías devanceiras páxinas o insine Don Xacinto Benavente fai unha vívida louvanza do autor, bó exempro dos brillantes mozos inteleituaes que érguense por sí mesmos lonxe da terra na que naceran e da que se lembran con irrefreabre saudade, sentimento que latexa nas páxinas deste libro nas que se evocan os feiticeiros pazos galegos e os inesquecibres recunchos onde decorrera a nenezza do escritor.

En 1928 publicou Sigüenza dúas obras en verso: unha en castelán, nas Américas, co tiduo de "La ruta aventurera", e outra na nosa fala, "Cántigas e verbas ao ar", editada en Santiago pola Editorial "Nós", e cuía segunda edizón emprentouse en 1957 nos obradoiros tipográficos de "El Faro de Vigo". Este traballo, que mereceu ser prologado pola esgrevia poetisa uruguaiá Xoana de Ibarbourou, contén 47 poemas curtos, abondosos de metáforas orixinaes e de alusóns aos desportes. A obra foi acolida moi ben pola crítica, como dedúcese dos favorabres xuícios recollidos nas derradeiras páxinas do libro. Benavente di: "Le felicito, satisfecho de haber sido su padrino literario". E Don Ramón del Valle Inclán escribe: "Julio Sigüenza es un buen poeta de los pazos gallegos".

En 1931 ve a luz en Montevideo o seu "Cuaderno del ojo sin sueño", feixe de poesías nas que relocen as máis novas tendencias, se ben a emotiva composición elexíaca tiduada "Despedida a Manuel Antonio" segue a liña tradicional.

En 1937 publica en Vigo as súas "Canciones extraviadas", embebidas de fondo lirismo, que compuxera nas Américas polos anos 1922 e 1923, e na mesma cidade publicou tamén outra obra en verso, os "Poemas del Imperio".

Poidéramos, polo seu contido, pór á beira das obras poéticas a que tidoúo "Del amor y de la muerte", emprentada na Habana no ano 1924 co limiar de Don Moisés Vincenzi, reitor da Universidade de San José de Costa Rica. Contén un bó ramallo de belidos poemas en prosa que Don Xulio Rodríguez Yordi, distinto membro de número desta Real Academia tan querido e relembado por todos nós, calificara de "delicadas miniaturas en las que la prosa se adelgaza y sutiliza y ofrece tornasoles líricos y dramáticos (1).

Tamén na Habana no mesmo ano publicóuse "El Lobo", novela curta de ambiente galego, i en 1930, en Montevideo, outro libro en prosa, "Galicia, cara y cruz", que contén enxunllosos ensaios encol de Rosalía, Curras y Pondal, a carón de outros que refírense a relevantes persoalidades das letras, das artes e da historia; inspiradas páxinas adicadas a diferentes cidades galegas, sin esquecer á Cruña onde nacera, da que fai ardententes gabanzas; e outras, por fin, nas que ao afrontar os máis diversos temas galegos espéllanse as fondas inquedanzas que sentía Sigüenza polo porvir da nosa terra.

Dedúcese do devandito a intensa aitividade literaria desenrolada por Don Xulio Sigüenza, sempre tinxida polo seu apaixonado amor a Galicia. Os seus indiscutíbles merecementos fóronlle recoñecidos cando se fixo a proposta pra a súa desinación como membro numerario desta Real Academia "por ser uno de los valores más acusados de nuestra región, a la que ha prestado innumerables servicios a través de las actividades a que viene consagrándose, particularmente desde los Centros Gallegos de Buenos Aires y Montevideo".

Podémonos maxinar a emoción e ledicia que Sigüenza sentiría cando lle foi imposta a medalla de académico o 28 de Xaneiro de 1956 polo esgrevio presidente desta Corporación naquel intre Don Manoel Casás Fernández. O seu discurso de ingreso, fina peza literaria, versóu encol de "Un gallego universal: José Alonso y Trelles, el Viejo Pancho", poeta nado en Galicia que arreigara no Uruguai, onde acadóu grande sona, i en cuias obras, fonda e detidamente estudadas por Sigüenza, atópase a veta da nosa "saudade". O seu maxistral discurso foi contestado polo inesquecible académico de número Don Anxel del Castillo López, quen

(1) Nota necrolóxica que escribira Don Xulio Rodríguez Yordi pra publicar no *Boletín de la Real Academia Gallega*.

glosóu, con grande achego de datos e brilantísimo estilo, a vida e a obra de Xulio Sigüenza.

Chegados ao cabo desta sinxela sembranza de Don Xulio Sigüenza Raimúndez, aprácenos recoller as palabras que a esquisita poetisa uruguía Xeana de Ibarbourou stampa no limiar que escribėu pra "Cántigas e verbas ao ar": "Julio Sigüenza no es un gallego únicamente por el azar de haber nacido en una de las cuatro provincias seculares de Alfonso el Sabio, sino por su espíritu, que tiene todas las características de su raza nostálgica y romántica, a la vez aventurera y hogareña"... "El gallego nace con el signo de la saudade en la frente. En su tierra suspira por todas las tierras del mundo; lejos de ella su ilusión y su ensueño es volver al lar".

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
CHICAGO, ILLINOIS

AVANZOS NO COÑECIMENTO DA XEOMORFOLOXIA DE GALICIA

Galicia presenta, a quen a percorre e sabe ouservalo, unha moi ampla variedade de aspectos e paisaxes. Esta ricaz paisaxística, estudada con grande acerto e fina sensibilidade por Don Ramón Otero Pedrayo (1926, 1928), non é somentes o produto do seu tapiz vexetal sempre verdecente, senón tamén o resultado da atraente e orixinal aicidentación que o seu releve amosta, tanto no interior como no seu incomparabre litoral. A descripción das formas do releve, tal como son hoxe, pertence ao ámeto da xeografía, mais a xeomorfoloxía tenta darnos unha interpretación do modelado, e aleizoarnos encol dos procesos que colaboraron na súa xénese.

Na perspetiva xeolóxica, Galicia é un auténtico mosaico de afroramentos rochosos, dispostos en arcos groseiramente paralelos con a concavidade cara ao leste, e interrompidos por rochas intrusivas ácidas e básicas, que chámanse discordantes por non se axustaren á ordeación xeral. Estes afroramentos espállanse polo espazo dun xeosinclinal cuos sedimentos foron plegados por vellas oroxenias e atravesados despois polas rochas intrusivas. Das imponentes serras criadas entón nada perdurou, a esceición das raíces daqueles anterros cordales herciniáns remodeladas en novas formas montañosas polos ciclos erosivos que seguiron á súa ereición.

Da descripción e repartimento do rochedo no solar galego ocupáronse, entre outros, G. Schulz (1835), Ch. Barrois (1882), P. Hernández Sampe- layo (1922, 1931, 1935 a y 1935 b), W. Carlé (1945), e dun xeito especial I. Parga-Pondal, tanto nos seus traballos particulares (cfr. sobre todo 1956, 1958, 1960, 1962, 1963 a, 1963 b, 1966 a y 1966 b) como nos efectuados en coneisión co Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (follas e memorias do Mapa Xeolóxico de España, escala 1:50.000, e Mapa Xeolóxico da

provincia da Cruña, escala 1:200.000, que especificanse na bibliografía). Obra persoal do profesor I. Parga-Pondal é o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, dende o que o doutor Parga leva a reitoría e coordinación de canto concerne á investigación xeolóxica de Galicia, e que dispón de salas de traballo, mapas en releve, ricaces coleccións de mostras de rochas galegas coas preparacións microscópicas e microfotografías das mesmas, ficheiros, biblioteca e todo aquilo que precisase pra traballar en xeología, do que informou estensamente o profesor V. Sos (1953 a, 1953 b). Débense tamén á súa iniciativa as Xuntanzas de xeólogos nacionais i estranxeiros que periódicamente celébranse en Santiago de Compostela, nas que dase conta dos importantes traballos de investigación efectuados nos derradeiros anos na nosa terra (1965, 1967, 1969); e pódese afirmar que no presente intre estas investigacións toman no noso país un podente pulo.

Após destas curtas consideracións encol do desenrolo aitual dos estudos xeolóxicos en Galicia, concretarémonos xa a espór algúns dos dominios de investigación nos que, nos tempos recentes, fixéronse avances da maior importancia pra o coñecimento da xeomorfoloxía galega, que coidamos encaixan nos temas que seguen:

1. A meteorización na súa relación coas formas do releve.
2. O desenrolo das superficies de erosión.
3. As orixes das rías galegas.

A METEORIZACION NA SUA RELACION COAS FORMAS DO RELEVE

Un dos factores que máis decisivamente interveñen no modelado do releve terrestre é, sen dúbida, a meteorización. Os compoñentes aitivos do ar e as variacións de temperatura producen no rochedo efectos físicos e químicos que tradúcense no afrouxamento e posterior desagregación da rocha. Pouco a pouco cóbrese aquela dunha codia de material alterado que poderá ser arrastado polas augas e demáis axentes xeolóxicos, ficando ao ar outro anaco de rocha sana chamada a correr a mesma sorte. O resultado final é un rebaixamento continuo das formas do releve orixinariamente en resalto.

Os efectos da meteorización dependen da natureza e particular vulnerabilidade de cada rocha que é función, á súa vez, de moitos factores.

Aínda nas rochas do mesmo tipo rexístranse variacións de certa monta tocante do avance da meteorización e do xeito de levarse a cabo. Nun traballo publicado en 1953 polo profesor I. Parga-Pondal e o autor destas liñas, recoñécense diferentes tipos de meteorización e disxunción, e sinálanse as posibles relacións existentes entre os diversos modos de disxunción e a historia xeolóxico-teitónica de cada granito. No referido traballo distínguense tres principais tipos de disxunción, froito dos sistemas de diaclasas que fenden a rocha: disxunción paralelepipedica, disxunción esférica ou concéntrica, e disxunción en laxas, e ás veces cada unha delas deixa o seu impauto na paisaxe.

A disxunción paralelepipedica adoita presentarse, inda que non de maneira escrivida, nos granitos intrusivos, xeralmente biotíticos, que forman plutóns ou batolitos discordantes, é dicir, afloramentos que interrompen nidamente os das restantes rochas de arredor, exercendo sobre delas os efectos do metamorfismo de contacto. Os sistemas de diaclasas que atravesan estes granitos córtanse en ángulos case reitos. Pola súa presentación e pola ausencia de sinais de deformación teitónica importante, considéranse como granitos posteitónicos ou posoroxénicos. Os seus compoñentes minerais non amosan unha orientación definida, e se ben non son moi axeitados para os traballos de cantería, en Galicia outéñense deles piares para os viñales, e as súas lindas variedades porfídicas úsanse como pedras ornamentais, na forma de grandes laxas ben pulidas, para o revestimento de zócalos e fachadas.

A meteorización destes granitos é máis ben superficial e rápida, e o produto da súa desagregación consiste nun material areoso, cuarzo-feldespático que chaman xabre no país.

Este tipo de meteorización e disxunción preséntase típicamente no granito dos Penedos de Traba, montes que dende Traba se estenden hasta ao Cabo Vilán, cuxo faro érguese nun imponente cerro modelado nesta pedra de gran. Caracterizan a iste afloramento os hirtos relevos concretados en cristóns e penedias case desprovistos de vexetación, onde os grandes bloques, de forma máis ou menos cúbica, érguese a maneira de torreóns de paredes subverticais, xerados polos ben notos sistemas de diaclasas. A topografía resultante é roñiforme, e os nomes que levan as formas máis típicas son significativos (a Moa, o Castelo, etc.)

En moitos granitos discordantes, tanto biotíticos como de dúas micas, as diaclasas determinan o isolamento ou individualización de bloques coas

arestas arredondadas pola meteorización, a imitanza de grandes bolas, ou afrorando en estensas superficies conveisas.

En Galicia existen dabondo os granitos discordantes, xeralmente biotíticos. Pódense citar entre eles o granito do Monte Pindo, perto da foz do Xallas, polo que se esbarrocan en espeitacular fervenza as augas deste río; o da Cruña, que esténdese ao poente e ao sul da cidade; o que se atopa entre Caldas de Reis e a beira meridional da ría de Arousa, axuntándose por embaixo da mar co que afrora na illa que leva aquel nome, e co granito de Santa Uxía de Riveira; o de Pontearreas, Porriño e Salvaterra, que adéntrase en Portugal; o de Ribadavia e Pena Corneira; o que ao noroeste de Mondoñedo forma os cumes da Toxiza, e cara ao norte as Penas de Oirán e o Bico da Frouseira, sobranceiro do Valeidoiro; e moitos máis afroramentos cuio repartimento xeográfico pódese ver no Mapa Petrográfico Estructural de Galicia, escala 1:400.000, que elaborou I. Parga-Pondal (1963), no Mapa Xeolóxico da provincia da Cruña, escala 1:200.000, do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (1964), ou nas follas concernentes a Galicia do Mapa Xeolóxico de España, escala 1:50.000, publicadas hastra hoxe e reseñadas na nosa bibliografía.

A disxunción en laxes foi ouservada nos granitos gnéisicos de dúas micas, moscovita e biotita, pertencentes ao chamado por I. Parga-Pondal (1960) grupo de Laxe, e considerados polo referido xeólogo como granitos anatéiticos herciniáns. Estes granitos ocupan as dúas ribeiras da ría de Laxe, e dende alí esténdense cara ao sul polo extremo oeste da provincia da Cruña, i en faixas estreitas por áreas máis meridionaes. Máis ao leste hai outro afroramento que, partindo da costa por Sorrizo, Caión e Razo, alóngase con algúns despegos cara ao Bico da Meda, nos horizontes de Zas.

Este tipo de disxunción débese a que as diaclasas domiñantes forman un sistema subhorizontal, ao que se subordinan, polo xeral, outros sistemas oblicuos ou subverticais. Os feldespatos presentan a miúdo un alteramento caolínico que penetra fondamente no corpo da rocha, namentras ésta adoita amostrarse en grupos de blocos apranados cos cantos soavizados pola meteorización, de xeito especial nos cumios dos montes.

O que levamos dito a respecto dos granitos gnéisicos apricase, con certas limitacións, aos granitos comúns de dúas micas, xeralmente un tanto orientados, que asegún I. Parga-Pondal (1956, 1958) son granitos sinoroxénicos herciniáns, con moitos afroramentos en Galicia, entre eles

c que se espalla polos montes da Espenuca e da Costa do Sal; o granito da Serra de Barbanza, que investigou J. von Raumer (1962); o que con rumbo norte-sul vai polo oeste de Santiago de Compostela, e o que cobre grandes zonas da provincia de Pontevedra e da banda occidental da de Ourense.

A finura do seu gran e unha certa distribuíción ordeada dos seus minerais constitutivos, fan destes granitos unha pedra de cantería fácil de traballar.

Tocante da disxunción esferoidal, chamada tamén concéntrica, e típica das rochas graníticas de aboencia trondhjemitica, que forman unha serie de diferenciación con pouco ou ningún feldespato potásico, e na que a biotita é o mineral escuro máis importante, sin que os seus compoñentes minerais amostren unha orientación definida. Dáanse a miúdo tipos porfidicos de groso gran.

Estas rochas apresetáanse xeralmente en bolas arredondadas, ás veces individualizadas do conxunto do afroramento i espaxadas polo chan, polo que non é sempre tarefa fácil determinar os rumbos das diaclasas. O ataque dos axentes meteorolóxicos ten lugar por capas dun xeito concéntrico, i en moitos casos a separación parcial das que xa foron atacadas pon á vista o núcleo da rocha sana rodeado polos bordos das capas superficiais que aínda fican apegados a el.

A aparente concordanza dos seus afroramentos cos das rochas encaixantes débese a que o seu emprazamento sigúeu liñas de freatura moi fondas, que estimase foron abertas nos primeiros intres da oroxenia hercínica (I. Parga-Pondal, información verbal).

As granodioritas trondhjemiticas, no que se baseou o noso traballo (1953), forman unha estreita faixa que dende os arredores de Baio esténdese cara ao sul deica Serramo, orixinando un aliñamento montañoso pouco marcado, no que a rocha apresetábase nos cumios e zonas oufas en bolas de dous a catro metros de diámetro. Este afroramento, interrompido por despegos, alóngase polo sul-sudoeste cara a Colúns, perto do río Xallas, e dende alí colle a dirección sul-sueste pra achegarse á ría de Noia pola banda de Outeiro e a Barquiña, e xurdir aínda, pola abra de Abanqueiro, na ría de Arousa. Outro afroramento corre nun senso meridián polo norte de Negreira, e outro máis asínálase ao poente da Serra da Coba da Serpe (v. o Mapa Xeolóxico da provincia da Cruña, 1964).

Certos granitos gnéisicos glandulares aseméllanse, tocante da meteorización e da disxunción, aos granitos de cuio metamorfismo estímase que proveñen. Estes granitos chegan a formar bolas que lembran as que se ven noutras pedras de gran porfídicas e biotíticas, polo que se supoñen derivadas de rochas coma elas.

O problema da formación de blocos e agrupamentos de blocos graníticos foi encarado nos derradeiros tempos por F. Meinicke (1957), se ben dende outro ángulo. O referido autor fai comparanzas antre os granitos alemáns e os de Galicia, Cataluña e Portugal, e pon a maior atención nos factores climáticos do pasado. Os campos e amontoamentos de blocos graníticos teríanse formado no pleistoceno, ou cando menos se iniciaría entón o proceso pra continuar no cuaternario recente, pois as condicións climáticas do cuaternario antigo foron nidiamente favorabres pra dar lugar a elo. Supón Meinicke que un clima máis cálido que o aitual, seméllante ao do plioceno máis serodio, e aínda ao clima que rexe hoxe na nosa Península, explicaría a alteración areosa de certos granitos alemáns.

As rochas intrusivas non graníticas presentan xeitos propios de disxunción, se ben en xeral menos típicos. A marcha da meteorización e os produtos que se forman cambian de unhas a outras, de acordo coas súas características petrográficas.

Se das formas de disxunción, determinadas polo diaclasado preesistente, pasamos as formas de erosión, atopamos tamén feitos de grande interés. Cada tipo de rocha ofrece a súa resposta específica aos axentes erosivos, conforme ao seu grado de resistencia, dependente da composición mineralóxica, estrutura e testura. Os tratados de xeomorfoloxía adoutrinnannos respecto das diferentes formas do releve que resultan dos granitos, xistos, lousas, cuarcitas, calías, etc., y en Galicia confirmase o que din estes libros: as formas arredondadas en domo ou cúpula rebaixada, adequiridas ás veces polos afroramentos dos granitos discordantes; os relevos máis dondos dos granitos gnéisicos e de dúas micas, e os típicamente arpados que presentan as nosas serras nas áreas de xistos e lousas; o hirto modelado xerado a miudo polas pedras calías, como nos impoñentes Picos de Oulego, nos lindeiros das provincias de Ourense e León; e os cristóns que fórmanse ás espensas das cuarcitas e dos grandes filóns de cuarzo, como no espeitacular exempro do Pico Sagro, que nos amosra cómo pode perdurar e sobresaír no releve un afroramento resistente á erosión.

Nas rochas de orixe sedimentaria, que forman capas ou estratos sobrepostos, a inclinación ou buzamento das capas pode esteriorizarse na forma dos montes constituídos por elas. Cando a súa inclinación é comedia, orixínase un monte cunha ladeira apranada, cáseque paralela ao banco rochoso, namentras que a vertente oposta adoita ser hirta e irregular, por mor de teren sido cortados a traveso pola erosión os estratos que afroran nela. Amostran este tipo de modelado moitas montañas das zonas xistoso-calcáreas do norte da provincia de Lugo.

Outras veces o modelado é o refrexo da erosión dos terreos sedimentarios plegados, nos que alternan, paralelamente dispostos, vales e serras de formas alongadas, como pódese ouservar na banda oriental da provincia de Lugo, por exemplo, ao leste de Meira.

En calquer caso, e erosión diferencial fai ficar en resalto as rochas máis resistentes á meteorización e á erosión, e por eso os afroramentos graníticos sinálanse a miúdo na paisaxe polas máis outas cotas dos seus relevos, en comparanza coas dos relevos que as arrodean. Mais non existen regras xerais, pois hai granitos moi sensibres aos procesos de meteorización que dan relevos rebaixados respecto do seu contorno, como acontece co granito das bisbarras de Pontearreas, Porriño e Salvaterra, e co de Caldas de Reis, que forma un abaixado afroramento no que se instala un bó anaco da ría de Arousa, e sobre do que chamou a atención o profesor I. Parga-Pondal (1958), pra quen a fácil desagregación deste granito deberíase á rápida alteración das plaxioclasas, cecáis pola inestabilidade das súas estruturas cristalinas, namentras que H. Nonn (1966) a pon en relación coa porosidade deste tipo de granitos e co grandor dos seus cristales. Pra o morfólogo francés o granito porfidico da Cruña pódese comparar ao da ría arousana, e coida que elo colaborou a criar a forma un tanto irregular da badía cruñesa, o que esprícase tamén, en parte, polo feito, sinalado por nós, de se atopar entre ribeiras de diferente natureza rochosa, a oriental xistosa, e a occidental granítica (E. Torre Enciso, 1954).

A marcha do proceso da meteorización no granito da ría arousana foi ouxeto recentemente das detidas investigacións de E. B. A. Bisdom (1967), a quen débese unha fina tese doutoral adicada a este tema.

Ainda cando dous afroramentos graníticos de desigual natureza aparecen xuntos, acúsanse diferencias na paisaxe, e así, nos arredores do Cabo Vilán dase un nidio contraste entre o rispido modelado que caracte-

riza ao granito dos Penedos de Traba, e a dozura do releve fornecido polo granito gnéisico colindante, que xera lombas soaves de perfís continuos.

Outro feito que compre ter en conta é a posición que no conxunto do país ocupa o afroramento cuias formas de erosión estudamos. Unha mesma rocha pode non destacar na paisaxe se atópase entromedio dunha antiga superficie de erosión; en troques, sobresairá nidiamente na topografía cando constitui un releve residual inda respetado pola erosión que arrasou o seu contorno, ou ben, como nos di I. Parga-Pondal (1958), cando afroira perto dun dominio de recente remozamento erosivo. Moitas rochas xistosas de Galicia testemuñan estas afirmacións. Son elas as que forman un bó quiñón da divisoria oucidental da bacía do Miño —serra da Loba, serra da Coba da Serpe— erguéndose por riba de moitos relevos graníticos; namentras que outras rochas louseñas amóstranse en chairas horizontaes ou dondamente onduladas en niveles máis baixos. Outro tanto poderíase decir da rocha que leva o nome de ollo de sapo, da que ocupouse detidamente o profesor I. Parga-Pondal no seu Discurso de Ingreso nesta Real Academia (1960), cuios afroramentos en Galicia presentan aspectos moi variados (v. tamén I. Parga-Pondal, P. Matte e R. Capdevila, 1964).

Ao longo das golgas ou gargantas por onde corren os grandes ríos galegos pódense aperseber asimesmo notas diferencias na conduta das rochas tocante da acción do río encaixado nelas. E así, os vales e golgas estréitanse naqueles puntos cruzados polas cuarcitas ou polos grandes filóns de cuarzo, como o que, dende o Pico Sagro, alóngase cara ao sueste, xerando o estrangulamento da Ponte Ulla.

A acción dos esforzos teitónicos sobre das rochas pode debilitalas e predispoñelas a experimentar unha meteorización máis preseira do que fora de supór. Isto acontece cos afroramentos graníticos das zonas atravesadas por fraituras, nas que aquéles adoitan presentarse moi alterados e caolinizados polos influxos hidrotermaes e neumatolíticos, como tense ouservado, por exemplo, nos vales do Louro e de Meirama (v. follas de Túi, 1953, e de Betanzos, 1960), e asimesmo en Coens (folla de Laxe, 1953).

Os mineraes acesorios presentes no granito caolinizado de Coens (Laxe), foron miuciosamente estudados por I. Parga-Pondal e J. Pérez Mateos (1952).

Con esto, coidamos ter esaminado un asunto no que se ven traballando en Galicia con notas repercusións na morfoloxía do releve. A nosa

anterior exposición axudará a millor interpretar as consideracións encol dos outros puntos do temario.

O DESENROLO DAS SUPERFICIES DE EROSION

En todo o ámbito de Galicia existen anacos de antigos planaltos ou superficies de erosión millor ou peor conservadas, que practicamente son o punto de arranque das formas todas do releve, pois éstas orixinanse en xeral polo deterioramento que experimentan cando, por seren alzadas polas forzas tectónicas a niveles máis altos que aqueles nos que se formaron, desencadeouse sobre delas a acción dos axentes erosivos. A nova onda erosiva, adentrándose pouco a pouco na vella superficie de erosión, chega a disecala nun país de vales e montes onde rexen as desigualdades do releve. Mais si a súa acción dura moito, chégase a elaborar unha segunda superficie de erosión dondamente ondulada a unha altitude inferior, próxima ao chamado nivel de base, marcado, en xeral, polo nivel mariño. E naturalmente, a superficie de erosión máis baixa é sempre máis moderna que os restos das outras situadas por riba dela.

Os nosos xeógrafos faláronnos xa da existencia destes alzamentos do macizo galego —R. Otero Pedrayo (1926, 1928), A. Fraguas y Fraguas (1953), F. J. Río Barja (1956)— que fanse notos polo encaixamento da rede fluvial xerado pola erosión liñal dos ríos sobre das chairas alzadas. Velahí a orixe das fondas golgas que amostran os nosos ríos, de xeito especial o Eume, o Sil e o Miño, sementadas hoxe de xigantescos aproveitamentos hidráulicos. O encaixamento iníciase xeralmente na embocadura do río, avanzando cara ao montante, e na gráfica do perfil lonxitudinal de moitos ríos galegos apercébase un cóbado ou rompimento da pendente no punto do seu curso deica onde remontou a derradeira onda de erosión fluvial.

Galicia sufréu repetidamente procesos de vagaroso levantamento epixénico interrompidos por longas pousas, durante as que os axentes erosivos tiveron tempo dabondo pra chegar a criar unha nova superficie de erosión ás espensas de outra situada máis outa, que deste xeito mermábase na súa extensión. Cada alzamento do zócalo galego estaría, pois, ligado ao desenrolo dun ciclo erosivo, cúa derradeira fase cumina nun nivel de arrasamento. Mais esta fase non chega ao seu complotado desenrolo si é interrompida por un novo levantamento epixénico.

Os erguementos do macizo galego non sempre tiveron lugar dun modo uniforme, senón que, ás veces, áreas prósimas xeralmente limitadas por fallas ofrecen unha historia epiroxénica diferente, visto que unhas partes alzáronse máis que outras, e bascularon ben cara ao norte, ben cara ao poente. O primeiro ocorrélle á zona norte das provincias de Lugo e da Cruña, e o segundo á parte oucidental desta provincia e á de Pontevedra, infruindo na orientación da rede fluvial.

A isto hai que engadir a existencia de áreas que, lonxe de seguir o alzamento das zonas circunveciñas, ficaron convertidas en depresións onde fóronse acumulando podentes capas de sedimentos. O seu detido estudo consentiu outar importantes conclusións tocante da idade das deformacións do zócalo, as condicións climáticas que presidíronas e a vexetación domiñante na época.

Estas diferencias de conduta, que criaron a sorprendente variedade de formas do releve de Galicia, serían inespricabres si o vello zócalo non estivese sulcado por fraituras, ás veces moi fondas, que escindíronlle en blocos e compartimentos non sempre fácilmente delimitabres, antre outras cousas porque a erosión tende a igualar os desniveles xerados por aquélas.

A existencia en Galicia de diversas superficies de erosión, hoxe transformadas en altiplanicies ou chairas, evidénciase ao percorrer o país. Abonda saír da Cruña pola estrada que vai a Castela pra se dar un conta da presenza de varios planaltos dispostos escalloadamente. Pra investigalos ben é mester efectuar un estudo de conxunto, mais a determinación da súa idade vese dificultada pola pouquedade de datos paleontolóxicos. O primeiro tento de escrarecer estes probremas fixérono os profesores P. Biró e L. Solé (1954), aos que debemos moitas suxerencias e un mapa esquemático morfolóxico de Galicia, mais as maiores precisións fóronos fornecidas recentemente por H. Nonn (1966), quen na súa fina tese doutoral encol das rexións costeiras de Galicia, trata largamente estas cuestións.

Pra este xeomorfológo francés existirían unhas superficies de erosión principaes, formadas na primeira parte do terciario no clima tropical vivente na Europa oucidental naqueles tempos xeolóxicos, favorable á meteorización química do rochedo e á caolinización dos granitos. Polo que concerne á metade oeste de Galicia, o desenrolo destas vellas superficies de erosión tería respetado somentes os dominios das nosas serras centraes

—que forman a raia entre as provincias da Cruña e Lugo—, conceituadas como relevos residuales dun modelamento máis antigo, preterciario, e conservadas a maneira de montes-illas que, en algúns casos, poderían provir de vellos "horsts". O seu nivel máis outo, dos cumes, álzase nidiamente por riba das vellas superficies de erosión que arrodean estas serras, e según H. Nonn hai boas razóns pra supór que o arrasamento desta superficie de cumes habería finado, ben no cretácico, ben no eoceno inferior, ou cecáis ao termo do paleóxeno. A ausencia de depósitos sobre da superficie destas serras empece precisar a súa idade. Non se sabe cando tivo lugar o soerguemento que convertéunas en "horsts". Cóidase que poidera coincidir coas fases pirenaica ou sávida da oroxenia alpina.

Por embaixo do nivel superior das serras existe unha superficie de erosión máis estensa aínda, que foi chamada superficie fundamental ou principal (P. Birot e L. Solé, 1954), constituída, según H. Nonn (1966), por dous niveles distintos separados por diferencias de altitude de arredor de cen metros. H. Nonn (1966) chámaos tamén superficies eóxenas ou eo-oligocenas, por estimare que foron xerados entre a fase pirenaica (ou sávida) da oroxenia alpina e o final do oligoceno. Destes dous niveles, o superior podería ser sannoisiense ou estampiensense, e o inferior aquitaniense ou fini-oligoceno, de acordo coa probabre idade da fauna de moluscos atopada por J. Portela, inxenheiro xeólogo da Empresa Nacional "Calvo Sotelo", nos sedimentos margosos da depresión terciaria das Pontes de García Rodríguez. As devanditas margas conteñen attapulgita e illita, mineraes reveladores dun clima favorable ao avance dos arrasamentos, e ao desenrolo dun tipo de penichán xerado por pedimentación (J. Lucas, H. Nonn y H. Paquet, 1966).

A individualización dos dous niveles eóxenos orixinaríase, ben por un scave alzamento do zócalo galego —que tería que ver cos derradeiros ecos da fase pirenaica ou coas primeiras manifestacións da teitónica miocénica—, ben por un posíbre abaixamento do nivel de base mariño (H. Nonn, 1966). Levantamentos posteriores convertiron estes niveles nos planaltos de hoxe.

As mudanzas rexistradas no decurso do mioceno incidiron de xeito especial nos dominios periféricos das superficies eóxenas, e unha vez máis foron o resultado dun alzamento epiroxénico seguido dunha pausa e dun novo arrasamento. Un clima quente e húmedo perduraría hastra o final do mioceno, con intercalación dunha fase máis seca durante o tortoniense, o que dedúcese da natureza dos sedimentos arxilosos e ligníferos de

aquele idade acumulados nas Pontes (H. Nonn y J. Médus, 1963) e dos pólenes atopados neles i estudados por J. Médus (1965). En nido contraste coa vexetación e condicións climáticas que amostraba entón o interior da nosa Península, no ocidente de Galicia prevalecían aínda un clima e unha frota subtropical.

O arrasamento miocénico deu lugar a un nivel de erosión de amplitude comedida, situado arredor de cen ou douscentos metros por embaixo do que lle precedeu, nivel que dende diversos paraxes da costa avanzou varios kilómetros cara ao interior, rillando nos bordos dos planaltos eóxenos. A iste nivel eóxeno, xerado posiblemente ao longo do tortoniense, pertencerían, por exemplo, os replanos, hoxe en grande parte erodidos, que se estenden a altitudes moderadas polas bisbarras de Cedeira, as Mariñas e Bergantiños, marxinando os vellos penichás (H. Nonn, 1966).

O profesor Nonn supón que os erguementos neóxenos efectuáronse en dúas fases: unha no comenzo do mioceno, é dicir, pretortoniense; e outra máis serodia, postortoniense, á que correspondería, en grande medida, o encaixamento de moitos dos nosos ríos, cuos perfís lonxitudinaes revelan aínda os efectos deste derradeiro levantamento do zócalo. A segunda fase do erguemento finaría practicamente ao termo do terciario ou no principio do cuaternario, e habería elevado o nivel tortoniense á súa altitude actual.

Sinales de movementos epiroxénicos posteriores apercíbense en certos sectores costeiros, e deles trataremos despois.

Resumindo, o vello macizo galego experimentou, dende o final dos tempos secundarios, repetidos movementos de alzamento separados por longas pousas. Ao longo delas os axentes erosivos elaboraron os diversos niveles de arrasamento, hoxe trocados en planaltos, en xeral moi disecados pola erosión. O estudo das correlacións entre os niveles das diferentes terras de Galicia amóstrase cheo de dificultades, e as imprecisións concernentes á súa idade son a consecuencia natural da pouquedade de datos paleontolóxicos nos que basear as conclusións.

Nos abundantes gráficos que contén a tese do profesor H. Nonn pódese ver a distribución xeográfica que, según o referido investigador, presentan os distintos niveles de erosión na parte de Galicia que foi ouxetada das súas pescudas.

AS ORIXES DAS RIAS GALEGAS

No ano 1958, co gallo de rendir un moi xusto homaxe de admiración e afeuto ao esgrevio profesor Don Ramón Otero Pedrayo, ocupéime do problema das rías galegas, que non somentes ornan a nosa terra, senón que, dende tempos recuados, atrán as olladas dos científicos. Xa en 1886 o xeógrafo alemán F. v. Richthofen incorporou a palabra "ría" na terminoloxía xeomorfolóxica pra desinar unha forma costeira definida, e ao escoller as rías galegas como o millor exemplo de costa de rías, contribuíu a espallar polo mundo o nome de Galicia.

Máis tarde os xeólogos que estudaron o litoral da nosa Península ocupáronse tamén da costa galega, dun xeito especial os profesores españois L. Fernández Navarro (1910), E. Hernández-Pacheco (1912, 1932a, 1932b, 1955), P. Hernández Sampelayo (1914), J. Dantin Cereceda (1942, 1944) e F. Hernández-Pacheco (1949, 1950), cuas publicacións conteñen amplias referencias tocantes ao noso litoral.

Varios profesores estranxeiros interesáronse polas nosas rías, adicando especificamente a elas os seus traballos, como, por exemplo, H. Schurtz (1902), E. Scheu (1913) e W. Carlé (1947), namentras que os estudos de H. Lautensach (1928, 1941), J. Bourcart (1936) e C. Teixeira (1944, 1946, 1949), inda que concernen principalmente ao litoral do norte de Portugal, abranguen tamén un seitor da costa atlántica galega. O traballo publicado polo profesor francés P. Birot en colaboración co profesor español L. Solé (1954) contén asimesmo un bó feixe de ideas encol do noso litoral, do que tamén ocupouse estensamente H. Nonn (1958, 1960, 1964, 1966).

Non é lóxico que no presente intre repita as consideracións que xa foron espostas por min noutra ocasión, pro cecáis sexa comenente botar unha ollada á situación do coñecimento das rías arredor de 1958, pra logo amostar as principaes direccións nas que tiveron lugar avances de máis monta.

Nun principio, as rías tíñanse por formas litoraes características das costas mariñas transversas respecto da dirección dos plegues e terreos xeolóxicos, se ben hoxe apricase xeralmente este nome ao último treito dun val de orixe fluvial ben delimitado que ficou invadido polo océano, sin ter en conta a súa disposición relativamente á orientación dos plegamentos nos que se insere. É sabido que as nosas rías atlánticas

ábrese a traveso de estruturas que se estenden de norte ao sul, naméntras que as rías do seitor cantábrico son groseiramente paralelas ao rumbo dos afroramentos xeolóxicos.

Os xeólogos que, coma Scheu, ocupáronse detidamente das nosas rías, recoñecían a existencia de movementos verticais de alzamento no seu "hinterland" costeiro, visto que os cursos de auga, cuíos treitos finais trocáronse en rías, se encaixan nos dominios das vellas superficies de erosión. Mais outros feitos de observación que daban pé pra crer en fenómenos de alzamento e de abaixamento xustapostos, levaron ao profesor Scheu a pensar na existencia de movementos basculares que incidirían nos seitores das rías.

Tamén W. Carlé, no seu traballo encol das rías galegas (1947), decátase das contradicións que xurden no estudo da nosa costa. E asinala a existencia, en certos seitores do litoral, de estensas plataformas ou rasas de abrasión, hoxe alzadas unhas decenas de metros sobre do nivel da mar por mor dun postrimeiro levantamento epiroxénico das rexións costeiras, as que, xunto coa presenza de fervenzas nos treitos prósimos á costa de moitos dos nosos ríos, contrapóñense ao feito do sulagamento das focas fluviaes. Nun tento de armoñizar os testemuños do levantamento cos do afundimento, supón Carlé que o vello zócalo cristaiño galego, na súa tendencia a se erguer, teríase fendido según diferentes direccións de fraitura, producíndose abaixamentos en certas áreas costeiras que facilitarían a formación das rías. Máis tarde, un anovado movemento de alzamento, habería arrastado consigo as plataformas de abrasión mariña que amostran algúns seitores.

Xa vimos hastra qué punto os movementos de erguemento incidiron nas rexións costeiras de Galicia, e cómo estes alzamentos tiveron un valor moi desigual nas diversas zonas do litoral, ben pola escisión do macizo galego en blocos ou seitores relativamente independentes (C. Teixeira, 1944, 1946; E. Torre, 1954, 1958), ben porque o levantamento tivera as características dunha combadura ou abobadamento compatibre cun basculamento máis ou menos nidio cara á mar que infruiría na orientación da rede fluvial. O desenrolo das nosas rías garda relación coa amplitude dos movementos de alzamento do "hinterland" costeiro.

Hoxe estímase certa a colaboración de importantes fraituras e fallas na xénese das nosas rías. O zócalo cristaiño galego foi fendido por fondas fraituras, antigas moitas delas, outras máis novas, e supóñese que

as primeiras experimentaron unha reactivación ao longo do terciario (v. memorias esplicativas das follas de Carballo, 1953, Tui, 1953, Laxe, 1955, e Muxía, 1955).

As fraituras que franxiron o macizo galego non sempre maniféstanse na paisaxe, xa que pola súa anterga idade foron hai tempo achafados os desniveles que elas criaran. Por outra banda, os deslizamentos dos bloques ao longo do plano de falla, pódense desenrolar nun senso horizontal, sen producir desnivelamentos verticais. En todo caso, a súa detección nunca é fácil, mais a miuciosa cartografía xeolóxico-petrográfica, elaborada principalmente polo profesor I. Parga-Pondal, levóu á descuberta de moitas delas, apenas dexergabres na topografía do terreo, evidenciadas noustante polos despegos e interrupcións que amostran os afroramentos rochosos. E cando camiñando pasamos pra o outro lado da liña de falla, ouservamos que o afroramento desprázase, ben cara á dereita (fallas destraes), ben prá esquerda (fallas sinistraes).

A cartografía petrográfica permitiu descubrir asimesmo o feito de que moitas das fallas que atravesan a zona norte do país levan unha dirección ONO-ESE, namentras que ao sul do río Xallas, e de xeito especial no seitor das rías baixas, as fraituras corren xeralmente nun senso SSO-NNE, ou sexa, que amostran unha orientación semellante á das rías.

En moitos casos estas fendas enchéronse de materiaes que chegaron a soldalas, xerando diques constituídos, as máis das veces, por rochas básicas ou filóns de diferentes mineraes, como os que arriquecen a xea de Galicia.

As fraituras non orientadas nun senso meridián, tiveronse como moi antigas. Supóñense posteriores ao plegamento hercinián, ou máis ben da última parte da referida oroxenia, como sostén o xoven xeólogo J. R. Parga nun traballo de recente publicación (1969), se ben sempre recoñecéuse que poidéranse reactivar ao longo do terciario. A mainitude dos desprazamentos rexistrados nalgunhas delas, revela a longa duración daquéles, pois os especialistas estiman que son a resultante da suma de pequenos esbaramentos sucesivos.

A máis do anterior sistema de fallas que atravesan, en figura de abano, o ocidente do noso país, atinxindo ás veces a costa, existe en Galicia un segundo sistema de fraituras de orientación norte-sul i idade probablemente terciaria, que abririáanse coincidindo coa reviviscencia experimentada polas antigas fallas. Este fraituramento do zócalo cristaiño ce-

cáis fose precedido de movementos epiroxénicos de abobadamento, podentes dabondo pra producir distensións na crusta terrestre que chegaran a crebar as zonas máis débiles. E como resultado destes repetidos alzamentos, as formas do releve espermentaron fases sucesivas de remozamento e de arrasamento erosivo que, inseríndose unhas nas outras, finarian por xerar unha paisaxe policíclica (v. espricación da folla de Túi, 1953).

Aínda hoxe as fallas de dirección norte-sul destácanse nidamente na paisaxe. A iste grupo pertence a importante fraitura meridiana que cruza polo ocidente de Galicia dende a praia de Baldaio, na costa norte de Bergantiños, deica Túi, na raia portuguesa, pasando por Carballo, vales do Dubra e do Sar, Padrón, Caldas de Reis, Pontevedra, Redondela, Porriño e val do Louro. Ao longo deste grande aicidente teitónico, que W. Carlé (1947) supoñía finase polo norte no val do Sar, atópanse varias fontes termaes (Carballo, os Ánxeles, Caldas) e algúns depósitos de caolín que, polo xeral, debéronse as aicións neumatolíticas e hidrotermaes vencelladas a aitividade desta fraitura. C. Teixeira (1944, 1946), J. M. López de Azcona (1947, 1956 e memoria da folla da Cruña), F. Hernández-Pacheco (1949b) e J. L. Gallego, F. Hernández-Pacheco e J. M. López de Azcona (1968) publicaron interesantes traballos encol das fontes termaes de Galicia.

Os despegos que apreséntanse ao longo desta falla (H. Nonn, 1966), caso de confirmalos a cartografía petrográfica, teríanse desenrolado nos comenzos do mioceno.

Outros aicidentes teitónicos meridiáns deteitabres na paisaxe son os seguintes:

1) A fraitura ou depresión teitónica que, paralelamente á devandita e a uns 8 ou 10 kilómetros ao leste, iníciase ao norte da Pontevea, non lonxe de Santiago, e alóngase cara ao sul pasando por Cuntis, o val do Tea e Salvaterra, adentrándose despóis en Portugal (v. a folla de Túi, 1953).

2) A que pasa ao leste da serra da Barbanza pra atinxir a ría de Arousa ao poente do Cabo Cruz (W. Carlé, 1947; H. Nonn, 1966; A. J. Pannekoek, 1966).

3) O aicidente teitónico que se supón deu lugar á outa costa reitilínea que esténdese dende a Guardia, na foz do Miño, deica o Cabo Silleiro, ao sul de Baiona, xa asinalada por E. Scheu (1913), W. Carlé (1940),

P. Birot e L. Solé (1954), e H. Nonn (1966). Nas memorias do Mapa Xeolóxico de España referentes ás follas de Oia (1954) e a Guardia (1956) fá-lase detidamente desta fraitura.

Coidamos que teríase de engadir aos citados aicidentes a depresión que no ámeto das rías do seo ártabro esténdese nun senso meridián dende a espazosa praia da Frouseira, ao poente de Valdoviño, hastra a ría ferrolana, descrita co nome de val de Trasancos (E. Torre, 1954), tamén visible máis ao sul na parte central da península de Mugardos. Aínda que son grandes as diferencias do rochedo, non o parecen dabondo pra dar es-
pricación desta curiosa depresión encadrada antre outos montes, nin tampouco pódese apoñer á acción erosiva dos riachos que a percorren. Pra nós este aicidente tectónico, xunto con outras fraituras de dirección ONO-ESE, interviría na configuración do grupo de rías cruñés.

Certamente moitas son as fraituras que fenden o zócalo galego, unhas ben nidias, outras disimuladas, das que informan os traballos existentes. As máis notas criaron desniveles aínda ben manifestos, que fanse patentes nos mapas topográficos, escala 1:50.000, do Instituto Xeográfico e Cadastral, e aínda millor no mapa en releve de Galicia, escala 1:100.000, elaborado polo doutor I. Parga-Pondal a base dos anteriores, un de cuos poucos exemplares disponibles alcóntrese no Instituto Masculino da Cruña (1).

A participación destes sistemas de fraituras na xénese das rías galegas foi en xeral aceptada. As rías do seitor cantábrico deben tamén en parte a súa configuración ás fraituras que cruzan por aqueles dominios costeiros, infruindo asimesmo na súa formación os factores estruturais e litolóxicos, o retroceso das vertentes montañosas nas que se encadran, e a erosión fluvial, á cal deberíase esencialmente o escavamento do terreo nas fases de regresión mariña. Dun xeito indireito colaborou no seu desenvolvemento a importante fraitura que dende os arredores de Meira (Lugo), deixando ao sul as terras chás luguesas, esténdese aprosimadamente na dirección SE-NO deica o bordo norte da depresión terciaria das Pontes de García Rodríguez, alongándose máis ao poente polo val de San Saturniño hastra atinxir a mar. O xogo desta fraitura, a máis do erguemento desigual do dominio que incrinaríalo cara ao norte, favorecería

(1) Os outros exemplares deste magnífico mapa en releve están no Laboratorio Xeolóxico de Laxe, na Universidade compostelana, no Instituto de Edafoloxía de Santiago e no Colexio Fingoi de Lugo.

o desenvolvemento das rías cantábricas, cuíos deseños supóñense outidos dende o cuaternario antigo.

A tese doutoral que en col das rías do litoral lugués vai publicar N. Teves Rivas, fornecerá, sen dúbida, maiores esclarecementos.

Polo que atingue ao grupo de rías do ámeto cruñés, das que ocupéime noutra ocasión (1954), parece certa a intervención dos dous sistemas de fraituras xa citadas, e de xeito especial as que levan unha orientación ONO-ESE, cruzando os espazos que median entre a península da Torre de Hércules e a costa oeste de Riaza. Algo máis ao sul das anteriores, esténdense outras fraituras, como a que orixinou o val tectónico de Lourada, e a que, arrincando da praia de Baldaio, sigue polo treito máis outo do Anllóns pra finir xerando o val de Meirama - As Encrobas, na ladeira sul dos montes de Xalo. É probable que esta fraitura dera lugar a un desnivelamento que espricaría o rumbo seguido polo curso outo do Mero e dos seus afluentes esquerdos, e facilitaría a escavación erosiva da ría cruñesa ao longo das fases de regresión mariña.

A invasión polas augas mariñas no período posglaciarío determina o desmembramento dos ríos que converxen no seo ártabro, dando a falsa impresión de seren ríos independentes.

A existencia dunha fraitura próxima ao eixe NO-SE do grupo de rías cruñés, parece segura, pois coincide cunha liña sismotectónica que o sismólogo A. Rey Pastor coida que cruza pola costa naquela dirección. Dende 1845 hastra 1945 téñense rexistrado quince seísmos cos epicentros localizados na viciñanza da devandita liña, unha das máis activas entre as galegas. Este feito contradí a infundada crencia na inmunidade sísmica de Galicia, e próbanos, en troques, a súa relativa inestabilidade tectónica. (v. o esquema sismotectónico de Galicia na espricación da folla xeolóxica da Cruña, 1948).

Tocante da idade destas fraituras coida H. Nonn (1966), baseado nas análises polínicas dos depósitos de lignitos de Meirama efectuados por J. Médus (1965), que a reactivación do accidente que xerou o val das Encrobas débese producir entre o aquitaniense e o tortoniense, se ben o alzamento das superficies de erosión que lindan coas rías pola banda oriental pódese considerar como posmioceno. No que concerne á fraitura que abréu a embocadura común destas rías entre o Cabo Prioiroño e a península da Torre de Hércules, cóidase que se trata dunha falla antiga, avivecida durante a segunda metade do terciario.

Sen dúbida as fraituras e fallas participaron tamén na formación das rías baixas. Abrense no prolongamento, cara ao norte, da fraitura que se supón deu lugar á costa retilínea que se espalla dende a vila da Guardia hastra o Cabo Silleiro, e as rías máis meridionales limitan ao leste co accidente meridián que pasa por Padrón, Pontevedra e Redonde-la, e que estímase ter intervido asimesmo na súa xénese (A. J. Pannekoek, 1966). A orientación NE-SO que elas levan, supónse en xeral derivada do sistema de fraituras de dirección semellante que cruzan pola zona (W. Carlé, 1947; P. Birot e L. Solé, 1954; E. Torre, 1958, H. Nonn, 1966), das que algunhas estiveron aitivas durante o terciario, xerando compartimentos que mantivéronse outos, a maneira de verdadeiros "horsts", e outros que, en troques, afundíronse, contribuíndo a criar o espazo hoxe asulagado baixo da mar. Así, pódese conceituar como un "horst" o bloco da serra da Barbanza, inserido entre as rías de Noia e de Arousa, se ben na xénese e na irregular feitura desta última xogóu un papel importante, a carón das accións teitónicas, a fácil erosión do granito biotítico de Caldas, que afrra na beira sul da ría arouzana (I. Parga-Pondal, 1958).

Un grupo de profesores dos Países Baixos efectuaron hai pouco de-tidas investigacións encol da morfoloxía, sedimentoloxía, oceanografía e bioloxía mariña desta ría de Arousa, que ben pódese considerar como unha das rías galegas millor estudadas hastra hoxe (L. D. Brongersma y A. J. Pannekoek, 1966).

A intervención de fraituras arrumbadas no senso NE-SO, que terian sido funcionaes ao longo da segunda metade do terciario, estímase certa no que respeita á formación das rías de Pontevedra e Vigo, que coída H. Nonn (1966) atinxirían as súas principaes características no inter-glaciario Riss-Würm (v. tamén W. Carlé, 1947, P. Birot e L. Solé, 1954, e A. F. del Riego, 1958).

Finalmente, o curso inferior do Miño foi estudado na súa relación coas rías baixas, pois sorpréndese a moitos o feito de non ter dado lugar o Miño a unha ría comparabre ás outras. C. Teixeira (1944), sitúa no seu curso final o límite entre o bloco miñoto, que esténdese polo sul, e o chamado bloco galego, emprazado ao norte. Certamente é probabre que este seitor do curso do río teña que ver coa presenza dun accidente teitónico, se ben é máis dubidoso que iste accidente fose unha divisoria entre bloco-corticaes desnivelados. A ausencia dunha verdadeira ría no curso vestibular do Miño, hoxe convertido en amplo esteiro, débese cecáis, en parte, ao proceso de acumulación dos abondosos materiaes acarrexados polo río

(P. Birot e L. Solé, 1954; V. Sos, 1965; H. Nonn, 1966). Pra V. Sos o tramo terminal do Miño é algo así coma unha "ría frustrada", pois as súas dimensións, feitura e orientación xeral son semellantes ás das rías baixas veciñas, e denotan, en certo modo, unha historia común. E o feito do Miño non ter formado unha ría, é probabre se deba non somentes á importancia dos acarrexos fluviaes, senón tamén —como sulíña aquel autor e cremos nós— a que o seitor do río correspondente cecáis non se afundera dabondo pra que a mar poidese invadilo no grado preciso que permitira a evacuación dos sedimentos. Lembrémonos de que o Miño vérquese na mar nun seitor costeiro outo e reitilíneo moi diferente do das rías baixas, onde se supón que as fallas, e os afundimentos e desnivelamentos criados por elas, poideran espricar a súa xénese e o seu insospeitado desenrolo.

Hastra este intre, limitámonos a sulíñar a importancia dos factores teitónicos —erguementos, basculamentos, fallas— na formación das rías galegas, nas que enxérgase o impauto dos desnivelamentos e fraituras que contribuíron a formar as rías e facilitaron a aición escavadora dos ríos. Mais as rías non teríanse xerado sen a colaboración das grandes oscilacións do nivel mariño consecutivas ás frutuacións climáticas ocorridas durante o derradeiro millón ou millón e medio de anos da historia do planeta, é decir, ao longo do cuaternario.

Neste espazo de tempo houbo cando menos catro periodos glaciarios fríos —coñecidos polos nomes de güenziense, mindeliense, rissiense e würmiense—, separados por tres periodos interglaciarios nos que o clima semellábase ao de hoxe. Durante as fases de glaciación, o nivel da mar ficaba 80 ou máis metros por embaixo do nivel aitual, pois unha masa imponente de auga, estimada por algúns glaciólogos en 56 millóns de kilómetros cúbicos, quedou retida formando os xelos continentaes, de extensión i espesura considerabres, especialmente no norte de Eurasia e de América. Nestes periodos de regresión mariña, os ríos podían escavar os seus leitos por baixo do nivel mariño de hoxe, e o ancheamento e approfondación dos seus últimos tramos, favorecidos polos factores xa referidos, criaron os espazos que despóis trocariáanse en rías, cando se asulagaron nas augas oceánicas invasoras.

Durante os periodos interglaciarios o derretimento dos xelos continentaes fornecéu ao océano inxentes masas de auga que fixeron rubir o seu nivel, permitíndolle invadir as áreas escavadas pola erosión fluvial. Esta mar transgresiva penetróu nos treitos vestibulares dos ríos, e final-

mente adonouse deles despóis do derradeiro período glaciario ou würmiense, cuido termo tivo lugar, conforme aos datos outidos polo método do carbono 14, hai uns 11.000 anos.

Está probada a existencia de fases de intenso frío en Galicia. Confirmando, antre outros moitos feitos, o achádego de dous moares e algúns anacos de ósos de mamute nas fendas dunha canteira de pedra calia perto de Buxán (Lugo), próisima ao kilómetro 7 da carretera que vai de Oural ao Incio (E. Torre, 1962). É sabido que o mamute pertence a unha fauna fría característica do período würmiense, é decir, da última glaciación, que, conforme aos cálculos de D. B. Ericson e G. Wollin (1966), escomezou hai algo máis de 100.000 anos, e con lenes oscilacións mantívose hasta fai uns once milenios. Testemuñas fósiles desta fauna, afeita ás estepas frías, foron tamén descubertas nalgunhas das covas esistentes nas provincias de Santander e de Oviedo, sen que fallara algún achádego de restos de mamute, especie que aínda deixou vestixios da súa presenza en Cataluña e nos arredores de Madrid (1).

Estas alternancias climáticas cuaternarias, ou, máis esaitamente, pleistocénicas, tiveron lugar a escala mundial. Revélanos así, inúmeros feitos de ouservación e os recentes estudos dos limos e vasas acumulados nos grandes fondos oceánicos durante estes longos espazos de tempo, dos que pódese deducir a evolución das paleotemperaturas mariñas. Valéndose de dispositivos axeitados pra tales traballos, recóllense dos fondos núcleos ou mostras cilíndricas das vasas, algúns de máis de vinte metros de longo, que comenentementemente seleccionados, e utilizando os máis novos métodos xeocronolóxicos, escrarecen paseniñamente as escuridades que arrodean os tempos cuaternarios, e consinten chegar a unha cronoloxía aproximada das vicisitudes climáticas desta era (C. Emiliani, 1955; D. B. Ericson e G. Wollin, 1966). Neste tipo de investigacións destacan as promovidas polo Ouservatorio Xeolóxico Lamont da Universidade de Columbia. Xa no ano 1962 a colección de núcleos de mar fondo deste Centro comprendía máis de 3.000 mostras recollidas en máis de 40 espedicións.

Namentras se sucedían as oscilacións do nivel mariño, as rexións costeiras de Galicia erguíanse lentamente. Velahí por qué as terrazas fluviaes interglaciarias esistentes nas beiras de moitos ríos galegos e, de

(1) H. Nonn coída que hai razóns pra supór que en Galicia as primeiras fases glaciarias manifestárianse máis ben como pluviaes, tal como ocorreu sen dúbida en latitudes máis meridionaes.

xeito especial, no baixo curso do Miño, dispóñense en escadouro, e, como é sabido, son máis vellas canto máis elevadas (v. tocante as terrazas do Miño a espicación da folla de Tui, 1953, e os traballos de C. Vidal Box, 1941; H. Lautensach, 1941; M. Feio, 1948; C. Teixeira, 1949, 1952; V. Sos, 1965, e H. Nonn, 1966, 1967).

Un feito parecido dase na costa, onde os niveles mariños interglaciarios deixaron en certos sectores, por riba do nivel actual da mar, rasas ou plataformas costeiras ciceladas pola abrasión. O que proba a persistencia dun maino alzamento da costa durante a maior parte dos tempos cuaternarios, ao que viríanse a sobrepoñer as oscilacións do espello mariño.

Dous sectores de rasas costeiras ben desenroladas, tidas por Birot e Solé (1954) e máis por Nonn (1966) coma tirrenienses, atragueron moito a atención dos xeólogos: o sector da costa pontevedresa comprendido entre a Guardia e o Cabo Silleiro, ao sul da abra de Baiona; e o que esténdese de Ribadeo ao Cabo Burela, no litoral da provincia de Lugo. En ambos sectores de rasas mariñas amosan un notado desnivelamento, é dicir, que non se mantiveron horizontaes durante o movemento que as elevou á súa posición actual, senón que apresetáanse dondamente incrinadas dun extremo a outro da costa, e mergúllanse na mar cando se achegan respectivamente ás rías de Vigo e de Viveiro. Este feito proba nidiamente que a altitude actual das referidas rasas costeiras non é a resultante dun sinxelo descenso do nivel mariño, senón que houbo unha participación activa da crosta terrestre no proceso, como o denota o desigual alzamento do litoral.

Ao estudo das devanditas rasas adicáronse moitos xeólogos. Da do litoral pontevedrés e da veciña costa portuguesa —que atinxe perto da Guardia arredor de 35 metros de altitude, e samente 15 ou 20 no Cabo Silleiro— ocupáronse principalmente J. Bourcart (1936), H. Lautensach (1941), C. Teixeira (1944, 1946, 1949, 1952), P. Birot e L. Solé (1954) e H. Nonn (1966), e describíse tamén nas memorias esplicativas das follas de Oia (1954) e da Guardia (1956). Aínda é máis ampla a rasa do litoral cantábrico que dende o Cabo Burela, onde ten samente catro ou cinco metros de altor, esténdese cara ao leste por Foz, Ribadeo e a costa asturiana, erguéndose perto do Cabo de Peñas a 110 metros sobre do nivel da mar. A ela e aos depósitos sedimentarios que a cobren téñense referidos nos seus traballos C. Barrois (1882), L. Fernández Navarro (1910, 1916), E. Hernández Pacheco (1912, 1932a, 1932b), P. Hernández Sampelayo (1914, 1922),

J. Gómez de Llarena y J. Royo (1927), E. Cueto y Rui-Díaz (1930), F. Hernández-Pacheco e I. Asensio Amor (1959, 1960, 1964), H. Nonn (1960, 1966), G. Delibrias, H. Nonn y M. Van Campo (1964), I. Asensio Amor y H. Nonn (1964) e I. Asensio Amor e N. Teves Rivas (1965c), científicos que en xeral defenden a orixe mariña da rasa. Tocante da súa idade, hoxe téndese a considerala elaborada durante o tirreniense I, correspondente ao período interglaciario Mindel-Riss (P. Birot e L. Solé, 1954; H. Nonn, 1966).

A existencia de restos de rasas mariñas cuaternarias aínda máis outas e máis vellas é posible, pois hai os niveles de terrazas fluviaes correspondentes, e foi sinalada, antre outros, por H. Mensching (1961), de modo especial no sector costeiro que se estende antre as rias de Foz e Ribadeo, mais asegun H. Nonn (1966) algúns destes niveles son problemáticos no que concerne a súa idade e ao proceso de formación.

Polo contrario, é segura a existencia no litoral galego de algúns restos dispersos de rasas e praias antigas pendurados a 12-15 metros e a 5-8 metros sobre da mar, niveles que estimase corresponden respectivamente ao tirreniense II e ao ulxiense, ou sexa, ao derradeiro período interglaciario ou Riss-Würm (H. Nonn, 1966). Trátase de depósitos emprazados por baixo do nivel das rasas do tirreniense I, e que, a diferenza delas, non experimentaron sensíbles desnivelamentos dende a súa formación, como próba a súa altitude constante nos diferentes puntos da costa en que foron descubertos.

Fai arredor de 11.000 anos, após da retirada dos xelos aos seus límites atuais, ficou establecido na práctica o nivel mariño de hoxe. Dende entón o océano ocupa a súas presentes posicións que non semellan diferir grande cousa das que ocupou nos tempos correspondentes ao ulxiense ou monastiriense serodio, xugando pola situación dos restos de praias erguidas daquela época que foron atopadas.

Ao longo deste derradeiro espazo de tempo, a acción das ondas mariñas limitouse, no esencial, ao retocamento e á regularización da liña da costa, erodindo as saliencias, puntas e cabos que penetran na mar, e soavizando os reentrantes e abras cos depósitos de praia. O traballo de erosión mariña dependeu moito da natureza do rochedo, pois namentras os sectores xistosos de pouca resistencia, deron orixe a seos litorales a miúdo ocupados polas praias, os paraxes costeiros constituídos por rochas máis duras —tales coma os granitos e gneises— mantivéronse en posicións avanzadas, esceito onde a acción demoedora da mar foi favorecida pola pre-

sencia de zonas de debilidade teitónica. Os referidos procesos esprican o feito de que nalgúns seitores do noso litoral, como o que se espalla antre Malpica e Caión, hai zonas que amóstranse en fase de nidio retroceso (I. Parga-Pondal, 1960), namentras que noutros treitos costeiros as augas mariñas invasoras apenas fixeron outra cousa que achegarse as ladeiras das lombas graníticas, que polo o seu aspecto aseméllanse aos verdadeiros cantiles.

A capacidade discriminativa da erosión mariña de fronte ao rochedo maniféstase hastra nas miudezas, de xeito especial naqueles seitores costeiros nos que a natureza da rocha cambea nun curto treito (W. Carlé, 1945). A erosión diferencial mariña débese tamén a existencia das infindas furnas espalladas pola costa (I. Parga-Pondal, 1960), que ás veces acusan a presenza de filóns ou diques de material alterado ou de rochas debilitadas por un estreito diaclasamento, namentras noutros casos ábrense baixo recheos formados por depósitos de talude, como acontece, por exemplo, nalgunhas furnas da costa de Arteixo.

Estos feitos son a causa de que a liña actual do litoral galego non coincida esaitamente coa que dedúcese da posición das poucas praias ulxienses atopadas hastra hoxe, nin tampouco, con máis razón, cos límites dos niveles de rasas tirrenienses que vénse en certos paraxes costeiros. Con todo, pódese afirmar con H. Nonn que a configuración da costa galega, no seu deseño xeral, non se aparta moito da que presúmese que amostraba o noso litoral no cuaternario medio.

Esto non contradí a idea, hai tempo mantida e confirmada agora polas investigacións de Nonn, de que a elaboración das rías débese iniciar, cando menos, ao final do terciario, de resultas da teitónica miocénica.

O reencheamento cos depósitos de esteiro dos espazos máis internos das rías, é un fenómeno moi recente aínda en marcha.

Nestes derradeiros anos hánse vido investigando os depósitos sedimentarios dos areales que marxinan o litoral, especialmente nos seitores das rías, e tamén en certos casos os sedimentos dos fondos. Neste grupo de traballos atópanse os efectuados na costa cantábrica por I. Asensio Amor (1959a, 1959b, 1960a, 1960b, 1960c, 1966), F. Hernández-Pacheco e I. Asensio Amor (1963), I. Asensio Amor e N. Teves Rivas (1964a, 1964b, 1965a, 1965b, 1965c), F. Hernández-Pacheco (1965), e I. Asensio Amor e L. F. Caraballo Muziotti (1968a, 1968b, 1968c, 1969); e máis os que levaron

a cabo nas rías baixas J. Gómez de Llarena e J. Pérez Mateos (1952), A. Fernández del Riego (1951, 1956), R. Margalef (1956), E. Sáinz-Amor (1960, 1962), H. Nonn (1964), J. M. Díez Taboada (1964, 1965, 1967) e W. S. Koldijk (1968). En moitos dos referidos traballos fíxose o estudo morfoscópico e granulométrico dos sedimentos, usando técnicas que consinten acrarar a súa orixe e chegar a conclusións de intrínseco xeolóxico.

A composición mineralóxica dos areales costeiros, especialmente no que concerne aos mineraes pesados que, en moitos casos, poden chegar a ter importancia económica, foi tamén oxeto de estudos, destacando os realizados por V. Soriano (1928), F. Pardillo e V. Soriano (1929), I. Parga-Pondal e D. Lorenzo (1930), I. Parga-Pondal (1935, 1963), I. Parga-Pondal e J. Pérez Mateos (1954, 1956, 1957), E. Sáinz-Amor e J. L. Amorós (1962), W. P. F. H. Graaff e C. F. Woensdregt (1963), J. Pérez Mateos (1965), e J. Pérez Mateos e L. F. Caraballo Muziotti (1969). O posíbre aproveitamento destes mineraes pesados, presentes na area de moitas praias galegas de resultas da meteorización das rochas que os conteñen e dos acarrexos fluviomariños —entre os que se atopan a magnetita, ilmenita, rutilo, circón, casiterita, granates e monacita—, foi investigado recentemente por C. R. Baltar (1966), perito no dominio das máquinas separadoras de mineraes.

* * *

Velahí, en síntese, o complexo cadro dos problemas que presenta a xeomorfoloxía de Galicia, e a longa cadea de traballos que tencionan escrarecelos.

No desenrolo das formas do releve interior e costeiro infruiron decisivamente non soio a desigual resistencia do rochedo cara aos axentes erosivos, senón tamén os movementos de feitura epiroxénica, a fraituración do zócalo cristaiño e as oscilacións climáticas que, no cuaternario, deron lugar a importantes flutuacións do nivel mariño. E ben que non seipamos con certidume o que o porvir xeolóxico ten reservado á nosa Galicia, podemos por estrapolación enxergar a sorte que lle agarda en liñas xerales nun futuro relativamente cercán.

Aínda está en marcha a vaga erosiva desencadeada polo derradeiro erguemento postortoniense do país. Os nosos ríos afondarán os seus leitos, a erosión fluvial remontará por eles, alongando as súas golgas terra adentro, a os fondos vales que iniciáranse namentras decorría o último ciclo erosivo, avanzarán cara ao interior, deixando pendurados no outo

os vales abertos polos devanceiros ciclos de erosión. O que, a fin de contas, vai determinar un enriquecemento da paisaxe así remozada.

Pódese tamén supór que os procesos epiroxénicos non se van deter. Pois aínda que as praias ulxienses, de altitudes sensiblemente iguais, non amosan polo de agora deformacións, a realidade é que éstas tense manifestado en tempos xeolóxicamente moi recentes, posteriores ao tirrenoense I, e case non houbo tempo pra que se establezan diferencias de altor deteítabres nos niveles ulxienses. En calquer caso, evidénciase que o macizo galego amotra, dende o comenzo dos tempos terciarios, unha nidia tendencia ao alzamento, o que tras longas interrupcións foi reaño-dado unha e outra vez.

A reativación dos movementos epiroxénicos fará entrar en xogo novamente unha parte das fraituras esistentes, e pódese adiviñar que entrambos factores acrescentarán perto do litoral os desniveles xa criados por eles, especialmente no sector das rías baixas.

É arriscado predecir si nun futuro moi lonxano mergullaránse na mar algunhas zonas do litoral galego. Certamente, os arcos que no chan forman hoxe os afroramentos rochosos, rómpense de súpeto pola costa, ficando a zona norte debaixo das augas mariñas, e a súa banda esterna de poente tampouco atopámola completa. O afundimento no océano de terras pertencentes ao dominio litoral parece confirmado despóis dos traballos que no ano 1964 levóu a cabo un grupo de científicos ingleses —M. Black, M. N. Hill, A. S. Laughton e D. H. Matthews— a bordo do buque oceanográfico Discovery II, encol de dúas importantes elevacións submariñas, de cumes achanzados, que foron descubertas a unhas cen millas de distancia da costa atlántica galega. Polas súas características xeolóxicas e xeofísicas poideran ter sido o prolongamento cara ao norte da chamada orla mesozoica terciaria portuguesa, que esténdese polo litoral lusitán, e na que hai dabondo calías cretácicas semellantes ás esistentes de fronte á nosa costa occidental. A parte máis outa destas formas de releve submariño, que ao final da era secundaria atopábase perto do nivel da mar, parece como si houbera descido, ao termo do cretácico, algúns centos de brazas, coincidendo cun erguemento do noroeste da Península. A referida descida orixinariase, ben polo xogo das fallas meridianaes, ben polo empenamento ou fleisión do litoral, onde xa preesistían certas desigualdades topográficas, e posiblemente coa colaboración aitiva das correntes de convección subcrustaes.

Estas ideas concertan ben coas espostas por F. Hernández-Pacheco en 1963, a quen fóronlle suxeridas polo estudo que dos foraminíferos da costa galega fixera C. Colom en 1952 nas mostras dos fondos submarinos recollidas nas rías baixas co gallo das campañas oceanográficas do barco español "Xauen" (1949-1950).

Tocante da persistencia no futuro das flutuacións climáticas cuaternarias, e das oscilacións do nivel mariño resultantes delas, os glaciólogos e os especialistas en paleoclimas aínda están envolveitos nas dúbidas, pois hastra hoxe ninguén sabe se os comezos dos tempos posglaciarios marcan o fin dos pasados altibaixos climáticos, ou si serán, pola contra, o limiar dun novo interglaciario, o que semella máis probabre. As leves mudanzas climáticas dos derradeiros séculos, considéranse hoxe en xeral como pequenas oscilacións de mesquiña transcendencia no conxunto do clima dos nosos tempos, visto que os glaciares atuais espermentaron avances e recuadas de pouca monta en diferentes ocasións. Mais si chegara a vir unha nova glaciación, os seus efectos poderíanse comparar xeomorfolóxicamente aos espermentados por Galicia ao longo do postrimeiro período glaciario, e terían especial repercusión nos dominios costeiros a causa da descida do nivel mariño.

Non sabemos de certo cal vai ser o porvir xeolóxico de Galicia, mais xa se escrareceu un bó quiñón da longa historia evolutiva do seu ricaz tesouro de finas paisaxes e formas de releve que é mester amparar e gardar como sagra herdanza que ten de ser legada ás xeracións vindeiras; pois a máis de constituir un recurso natural de primeira orde, que compre conservar e no posibre potenciar, son parte primacial do contorno no que fomos modelados dende nenos, e arelamos seguir recoñecendo nelas o souril e inconfundible sembrante da nosa terra nai.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a letter or document.

Lower section of faint, illegible text, possibly a signature block or a closing.

BIBLIOGRAFIA

- ASENSIO AMOR, I., 1959a. Erosión marina y formación de cantos rodados en la ría del Eo (zona galaico-asturiana). *Est. Geogr.*, n.º 75, p. 251-262.
- , 1959b. Observaciones geológicas sobre la naturaleza de cantos rodados de la ría del Eo. *Est. Geol.*, vol. XV, p. 25-31.
- , 1960a. Datos granulométricos de las arenas de la ría del Eo. *Est. Geol.*, vol. XVI, p. 93-97.
- , 1960b. Facies morfoscópicas de las arenas actuales de la ría del Eo. *Est. Geol.*, vol. XVI, p. 187-189.
- , 1960c. Primeros resultados de la aplicación del método Riviére al estudio de la evolución de los sedimentos arenosos actuales de la ría del Eo. *Est. Geol.*, vol. XVI, p. 191-194.
- , 1966. Sedimentología litoral. Los cordones playeros del golfo de La Masma (Lugo). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 64, p. 89-112.
- e CARABALLO MUZIOTTI, L. F., 1968a. Condiciones de sedimentación en la ría de Cedeira (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 66, p. 5-19.
- e —, 1968b. Contribución al estudio de los sedimentos detríticos en la ensenada de Cariño y ría de Ortigueira. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 66, p. 91-104.
- e —, 1968c. Origen y evolución del material fangoso-arenoso de las rías de Cedeira y Ortigueira. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 66, p. 191-194.
- e —, 1969. Sedimentación litoral. Los cordones playeros entre la Punta de la Chirlateira y el Cabo Prior (provincia de La Coruña), (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 67, p. 71-86.
- e NONN, H., 1964. Materiales sedimentarios de terrazas fluviales. I. Los depósitos de terrazas del río Eo y de las márgenes de su ría. II. Sedimentos de terrazas y aluviones actuales de los ríos Masma y Oro (provincia de Lugo). *Est. Geogr.*, n.º 96, p. 319-366.
- e TEVES RIVAS, N., 1964a. Estudio fisiográfico-sedimentológico de las Rías Altas Gallegas. I. Ría del Barquero (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 62, p. 163-185.
- e —, 1964b. Proceso erosivo marino y formación de canturrales en la ría de Foz (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 62, p. 347-359.
- e —, 1965a. El proceso de relleno con materiales arenosos y fangosos-arenosos en la ría de Foz (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 63, p. 17-34.

- e —, 1965b. Erosión marina y formación de canturrales en la ría de Viveiro (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 63, p. 49-62.
- e —, 1965c. Depósitos sedimentarios actuales y antiguos en la desembocadura del río Oro, ría de Fazouro (Lugo). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 63, p. 315-330.
- BARROIS, CH., 1882. Recherches sur les terrains anciens des Asturies et de la Galice (Espagne). *Mém. Soc. Géol. du Nord*, t. 2, n.º 1 Lille 630 p.
- BIROT, P. e SOLÉ SABARIS, L., 1954. Recherches morphologiques dans le nord-ouest de la Péninsule Ibérique. *Public. Inst. Geol. de la Univ. de Barcelona*, n.º 211 61 p.
- BISDOM, E. B. A., 1967. Micromorphology of a weathered granite near the ría de Arosa (NW Spain) Tese. Leiden. *Leidse Geol. Meded.*, vol. 37, p. 37-67.
- BLACK, M., HILL, M. N., LAUGHTON, A. S. e MATTHEWS, D. H., 1964. Three non-magnetic seamounts of the Iberian coast. *Quart. J. geol. Soc. Lond.*, vol. 120, p. 477-514.
- BOURCART, J., 1936. Sur l'évolution du littoral de la Péninsule Ibérique de la presqu'île de Peniche (Portugal) au cap Finisterre (Galice espagnole). *C. R. Ac. Sc.*, t. 202, n.º 17, p. 1448-1450.
- BRONGERSMA, L. D. e PANNEKOEK, A. J., 1966. Investigations in and around the ría de Arosa, north-west Spain, 1962-1964. *Leidse Geol. Meded.*, vol. 37, p. 1-5
- CARLÉ, W., 1940. Strudelkessel im Granit am Ufer der Bucht von Vigo (NW. Spanien). *Geol. d. Meere u. Binnengewasser*, t. IV, n.º 2, p. 247-249.
- , 1941. Karrenbildung im Granit des galicischen Küste bei Vigo (NW. Spanien). *Geol. d. Meere u. Binnengewasser*, t. V, n.º 1, p. 55-63
- , 1945. Ergebnisse geologischer Untersuchungen im Grundgebirgen von Galicien (Nordwest Spanien). *Gesetz Forsch.*, n.º 6, p. 13-36 ("Resultado de investigaciones geológicas en las formaciones antiguas de Galicia", versión de J. M. Ríos, en *Public. extranj. sobre Geol. de España*, vol. 5, p. 61-90, 1950).
- , 1947. Die westgalicischen Meereshuchten *Natur u. Volk* ("Las rías bajas gallegas" versión de J. Gómez de Llerena, en *Est. Geogr.*, n.º 35, p. 323-330, 1949).
- COLOM, G., 1952. Foraminíferos de las costas de Galicia (campanías del "Xauen" en 1949 y 1950). *Bol. Inst. Español de Ocean.*, n.º 15.
- CUETO Y RUI-DÍAZ, E., 1930. Nota acerca de las llanuras rasas y sierras planas de la costa de Asturias. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 30, p. 241-254.
- DANTÍN CERECEDA, J., 1942. Regiones naturales de España, t. I, 2.ª edición C. S. I. C. Madrid 397 p.
- , 1944. Tectónica del macizo galaico. 3.ª Reunión de Est. Geogr., p. 9-16. Madrid.
- DELIBRIAS, G., NONN, H. e VAN CAMPO, M., 1964. Age et flora d'un dépôt périglaciaire reposant sur la "rasa" cantabrique près de Burela (Galice, Espagne). *C. R. Ac. Sc.*, t. 259, p. 4092-4094
- DÍEZ TABOADA, J. M., 1964. Sedimentos costeros arenosos actuales de la ría de Arosa (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 62, p. 361-364

- , 1965. Procesos de acumulación y evolutivo de las fases arenosas actuales de la ría de Arosa (nota previa). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 63, p. 129-135.
- , 1967. Composición mineralógica de las arenas superficiales actuales de la ría de Arosa. I (n. pr.). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 65, p. 317-329.
- EMILIANI, C., 1955 Pleistocene temperatures. *J. of Geol.*, vol. 63, p. 538-578
- ERICSON, D. B. e WOLLIN, G., 1966 The deep and the past. J Cape. Londres. 292 p.
- FEIO, M., 1948. Notas geomorfológicas. II. Em torno da interpretação dos terraços do Rio Minho. *Bol. Soc. Geol. Port.*, vol. 7, fasc. 1 e 2. Porto
- FERNÁNDEZ DEL RIEGO, A., 1951. Determinación del carbónico de los fondos de la ría de Vigo. Cálculo del carbonato disuelto y consecuencias geobiológicas. *Bol. Inst. Español Ocean.*, n.º 44, p. 3-17.
- , 1956 El contenido en carbono orgánico de los sedimentos de la ría de Vigo. Algunos datos sobre la relación carbono-nitrógeno. *Bol. Inst. Español Ocean.*, n.º 78, p. 3-29.
- , 1958 Geognosia y geotectónica de la ría de Vigo. *Bol. Inst. Español Ocean.*, n.º 88, p. 203-311.
- FERNÁNDEZ NAVARRO, L., Las costas de la Península Ibérica. Ensayo de estudio descriptivo y razonado de sus particularidades. *Asoc. Esp. Progr. Ciencias*. Congr. de Zaragoza, 1908, t. IV, parte 1.ª, p. 131-159.
- , 1916 Paleogeografía Historia geológica de la Península Ibérica. Biblioteca Corona. Madrid 238 p.
- FRAGUAS Y FRAGUAS, A., 1953. Geografía de Galicia. Porto y Cía. Santiago de Compostela, 497 p.
- GÓMEZ DE LLARENA, J e PÉREZ MATEOS, J., 1952 Observaciones sobre los sedimentos de la costa de Galicia (campanas del "Xauen" en 1949 y 1950). Apéndice. Análisis mineralógico de algunas muestras. *Bol. Inst. Español Ocean.*, n.º 52.
- GÓMEZ DE LLARENA, J. e ROYO, J., 1927 Las terrazas y rasas litorales de Asturias y Santander. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 27, p. 19-38 (con adiciones na páx. 115).
- GRAAFF, W. P. F. H. e WOENSDREGT, C F., 1963. Heavy mineral analysis of the beaches between ría de Lires and ría de Muros y Noya (province La Coruña, N. W. Spain). *Est. Geol.*, vol. XIX, p. 9-14
- HERNÁNDEZ PACHECO, E., 1912. Ensayo de síntesis geológica del Norte de la Península Ibérica. *Trab. Mus. Nac. Cien. Nat.*, n.º 7, 136 p.
- , 1932a. Las costas de la Península Hispánica y sus movimientos. *Asoc. Esp. Progr. Ciencias*, serie V, Cien. Nat., 2.ª parte, p. 89-120.
- , 1932b. Síntesis fisiográfica y geológica de España. *Trab. Mus. Nac. Cien. Nat.*, serie Geol., n.º 38, 586 p.
- , 1955. Fisiografía del solar hispano. T. 1.º R. Acad. Cien. Ex. Fís. y Nat., Madrid. 657 p.
- HERNÁNDEZ PACHECO, F., 1949a. Geomorfología de la cuenca media del Sil. *Mem. R. Acad. Cien. Ex. Fis. y Nat.*, serie Cien. Nat., t. XIII, 114 p.
- , 1949b. La tectónica peninsular y su relación con las aguas mineromedicinales. Discurso de ingreso na Real Academia de Farmacia, e Contestación polo Dr. R. Casares López. Madrid. 134 p.


- , 1950 Las rasas litorales de la costa cantábrica en su segmento asturiano. *Extrait du C. R. du XVI Congr. Intern de Géographie, Lisboa, 1949; p. 29-82.*
 - , 1957. Las rasas de la costa cantábrica en el segmento oriental de Asturias *Public. Congr. INQUA, Oviedo, p. 5-12.*
 - , 1963. Probable orla mesozoico-terciaria submarina en el NW. de la Península Hispánica. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), t. 61, p. 231-238.*
 - , 1965. Origen de algunos acúmulos de gruesos cantos redondeados costeros. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), t. 63, p. 309-313.*
 - e ASENSIO AMOR, J., 1959 Materiales sedimentarios sobre la rasa cantábrica. Tramo comprendido entre las rias del Eo y Foz. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), t. 57, p. 75-100.*
 - e —, 1960. Materiales sedimentarios sobre la rasa cantábrica. II. Tramo comprendido entre la ría de Foz y el casco urbano de Burela. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), t. 58, p. 73-83.*
 - e —, 1963. El proceso de relleno con materiales fangoso-arenosos en la ría del Eo (zona galaico-asturiana). *Bol. Inst. Español Ocean., n.º 116, p. 3-32.*
 - e —, 1964. Recientes investigaciones sobre la génesis de la rasa litoral cantábrica (tramo final del valle del río Navia, Asturias). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), t. 62, p. 61-89.*
- HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., 1914. Estudio geológico de la costa de la provincia de Lugo *Bol. Inst. Geol. de España, t. 34-14, 2.ª serie, p. 81-172.*
- , 1922 Hierros de Galicia, t. I. *Mem. Inst. Geol. de España, t. IV, 483 p.*
 - , 1931. Hierros de Galicia, t. II *Mem. Inst. Geol. de España, t. IV, 561 p.*
 - , 1935. Hierros de Galicia, t. III, fasc. 1.º e 2.º. *Mem. Ins. Geol. de España, t. IV. 769 p.*
- INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 1948. Mapa Geológico de España, escala 1:50.000. Explicación de la Hoja n.º 21: La Coruña 101 p.
- , 1949. Explicación de la Hoja n.º 6: San Salvador de Serantes. 51 p.
 - , 1952. Explicación de la Hoja n.º 20: Sisargas (Coruña). 29 p.
 - , 1953. Explicación de la Hoja n.º 43: Lage (Coruña) 76 p.
 - , 1953. Explicación de la Hoja n.º 44: Carballo (Coruña). 100 p.
 - , 1953. Explicación de la Hoja n.º 261: Túy (Pontevedra). 94 p.
 - , 1954. Explicación de la Hoja n.º 260: Oya (Pontevedra). 28 p.
 - , 1954. Hoja n.º 68: Camariñas (La Coruña).
 - , 1955. Explicación de la Hoja n.º 67: Mugía (La Coruña). 42 p.
 - , 1956. Explicación de la Hoja n.º 298: La Guardia (Pontevedra) 37 p.
 - , 1957. Hoja n.º 69: Santa Comba (La Coruña).
 - , 1958. Hoja n.º 93: Outes (La Coruña).
 - , 1959. Hoja n.º 92: Finisterre (La Coruña).
 - , 1960. Hoja n.º 45: Betanzos (La Coruña). 2.ª edición.
 - , 1961. Hoja n.º 70: Órdenes (La Coruña).
 - , 1962. Hoja n.º 46: Oza de los Ríos (La Coruña)
 - , 1963. Hoja n.º 22: Puente deume (La Coruña).
 - con la colaboración de los SERVICIOS GEOLOGICOS DE PORTUGAL, 1963. Hoja n.º 299: Tomiño Caminha.

- INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 1963. Mapa petrográfico-estructural de Galicia, escala 1:400.000. Por I. Parga-Pondal
- , 1964. Mapa Geológico de la Provincia de La Coruña, escala 1:200.000. Por I. Parga-Pondal, J. L. López de Azcona y E. Torre Enciso.
- KOLDLJK, W. S., 1968. Bottom sediments of the ria de Arosa (Galicia, NW. Spain). Tese. Leiden. *Leidse Geol. Meded.*, vol 37, p 77-134.
- LAUTENSACH, H., 1928. Morphologische Skizze der Küsten Portugals. Sonderband, *Zeitschr. Gesellsch. Erdk.*, p 296-346
- , 1941. Interglaciales Terrassenbildung in Nordportugal und ihre Beziehungen zu der allgemeinen Problem des Eiszeitalters. *Pett. Geogr. Mitt.*, fac. 9, p. 297-311 (versión portuguesa co tiduo "Formação dos terraços interglaciários do Norte de Portugal e suas relações com os problemas da época glaciária", en *Publ. da Soc. Geol. de Portugal*, Porto, 1945; 47 p.).
- LÓPEZ DE AZCONA, J. M., 1947. Las aguas minero-medicinales de la provincia de La Coruña. 1.º Congreso Luso-Espanhol de Hidrología, p 133-142.
- , 1956. Las aguas minero-medicinales de la provincia de Pontevedra. *Notas y Com. del Ins. Geol. Min. de España*, n.º 41, p. 3-20
- , GALLEGO, J. L. i HERNANDEZ-PACHECO, F., 1968. Estudios sobre el manantial de Celdas de Táy. *An. R. Acad. de Farmacia*, nos. 3-4, p. 305-361.
- LUCAS, J., NONN, H. e PAQUET, H. 1966. Presencia de niveles con sepiolita y attapulgita en los sedimentos terciarios de Galicia (España). *Notas y Com.*, n.º 92, p. 71-78
- MARGALEF, R., 1956. Paleoecología postglacial de la ría de Vigo. *Inv. Pesq.*, t. V, p. 89-112.
- MÉDUS, J., 1965. Contribution palynologique à la connaissance de la flore et de la végétation néogène de l'Ouest de l'Espagne: étude des "sédiments récents" de Galice. Tese. Montpellier, 91 p.
- MEINECKE, F., 1957. Granitverwitterung, Entstehung und Alter der Granitklippen. *Z. deutsch. geol. Ges.*, vol. 109, p 483-498.
- MENSCHUNG, H., 1961. Die Rías der galicisch-asturischen Küste Spaniens. Beobachtungen und Bemerkungen zu ihrer Entstehung. *Erdkunde*, vol. XV, p. 210-224
- NONN, H., 1958. Contribución al estudio de las playas antiguas de Galicia (España). *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 8, y *Notas y Com. del Inst. Geol. Min. de España*, n.º 50, p. 177-193.
- , 1960. Les dépôts de la "rasa" cantabrique dans sa partie occidentale (Galice, Espagne). *Rev. Géomorph. Dynam.*, nos. 7-8-9, p 97-105.
- , 1964. Los sedimentos antiguos de la ría de Arosa. Algunas conclusiones geomorfológicas. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 16, y *Notas y Com.*, n.º 74, p. 143-155.
- , 1966. Les régions cotières de la Galice (Espagne). Étude géomorphologique. Tese Publ. Fac. des Lettres de l'Univ. de Strasbourg, Paris, 591 p. e 16 láminas nun anexo.
- , 1967. Les terrasses du Río Miño inférieur. Localisation et étude sédimentologique. *Rev. Géomorph. Dynam.*, n.º 3, p. 97-108.
- e MÉDUS, J., 1963. Primeros resultados de estudios geomorfológicos y palinológicos referentes a la cuenca de Puentes de García Rodríguez (Coruña, España). *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 15, y *Notas y Com.*, n.º 71, p. 87-94.

- OTERO PEDRAYO, R., 1926. Síntesis Xeográfica de Galicia. Ed. Lar Sem. Est. Gal., 84 p. Compostela.
- , 1928. Problemas y paisajes geográficos de Galicia. Bibliot. de Est. Gallegos Comp. Ibero Americana de Publicaciones, Madrid. 214 p.
- PANNEKOEK, A. J., 1966a. The ria problem The role of antecedence, deep weathering and Pleistocene slope-wash in the formation of the West Galician rias *Tijdsch. Kon. Ned. Aardr. Gen.*, t. 83, p. 289-297.
- , 1966b. The geomorphology of the surroundings of the Ría de Arosa (Galicia, NW Spain). *Leidse Geol. Meded.*, vol. 37, p. 7-32
- PARDILLO, F. e SORIANO, V., 129 Hallazgo de la monacita en las arenas de la ría de Vigo. *Asoc. Esp. Progr. Ciencias*, Congr. de Barcelona, t. IV, p. 141
- PARGA, J. R., 1969. Sistemas de fracturas tardihercinianas del Macizo Hespérico. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 37, 15 p (publicóuse tamén en *Geol. Rundschau*, vol. 59, n.º 1, p. 323-336, Stuttgart, 1969).
- PARGA-PONDAL, I., 1927 Sobre la presencia de ilmenita nas areas de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés. *Arquivos do Sem. Est. Gal.*, t. 1, p. 241 e ss. Santiago.
- , 1935a. Arena monacítica de la ría de Arosa (Galicia). *An. Soc. Esp. Fis. Quim.*, t. 33, p. 466-469.
- , 1935b. Ensayo de clasificación cronológica de los granitos gallegos. *Res. Cien. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 10, p. 27-34, y *An. Fac. de Ciencias de Porto*, t. 20, 15 p.
- , 1956. Nota explicativa del Mapa Geológico de la parte N. O. de la provincia de La Coruña. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 5 (publicóuse tamén en *Leidse Geol. Meded.*, Leiden, t. 21, p. 467-484).
- , 1958a. El conocimiento geológico de Galicia. Edt. Citania Buenos Aires. 21 p.
- , 1958b. El relieve geográfico y la erosión de los granitos en Galicia. Publicado no libro "Homaxe a Ramón Otero Pedrayo", p. 129-138. Ed. Galaxia Vigo.
- , 1960. Observación, interpretación y problemas geológicos de Galicia. Discurso lido no acto da súa recepción na Real Academia Galega (contén asimismo o discurso de resposta do Académico Numerario Dr. Lois Iglesias Iglesias). A Cruña, 54 p.
- , 1962. Xeoloxía de Galiza. Na "Historia de Galiza" dirixida por D Ramón Otero Pedrayo, t. I, p. 225-245. Ed NÓS. Buenos Aires.
- , 1963a. Mapa Petrográfico Estructural de Galicia, escala 1:400 000. Inst. Geol. y Min de España. Madrid.
- , 1963b. Rocas y minerales de interés económico del macizo galaico. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 14, e *Información Comercial Española*, Febr., p. 99-104
- , 1966a. Datos geológico-petrográficos de la provincia de La Coruña. En "Estudio Agrobiológico de la Provincia de La Coruña", Inst. de Inv. Geol., Edafol. y Agrobiol. de Galicia (C. S. I. C.). 43 p.
- , 1966b. La investigación geológica en Galicia 1.ª Reunión sobre Geología de Galicia y Norte de Portugal. Santiago de Compostela, 1955. *Leidse Geol. Meded.*, vol. 36, p. 207-210.
- e COLABORADORES, 1967. Carte géologique du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique, éch. 1:500.000. Serviços Geológicos de Portugal.

- e LORENZO, D., 1930. Sobre la presencia de la magnetita y de la ilmenita en las arenas de las playas gallegas. *An. Soc. Esp. Fis. Quim.*, t. 28, p. 353-357.
- , MATTE, PH. e CAPDEVILA, R., 1964. Introduction a la géologie de l'«Ollo de Sapo». Formation porphyroide antesilurienne du nord ouest de l'Espagne. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 18, y *Notas y Com.*, n.º 76, p. 119-153
- e PÉREZ MATEOS, J., 1952. Estudio de los minerales accesorios de las rocas alteradas. I El granito caolinizado de Lage. *Notas y Com.*, n.º 27, p. 119-149.
- e —, 1954. Los arenales costeros de Galicia. I La ría de Lage. *An. Edaf. y Fisiol. Veg.*, t. 13, p. 483-513. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 2.
- e —, 1956. Los arenales costeros de Galicia. II La costa de Finisterre. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 4, e *An. Edaf. y Fisiol. Veg.*, t. 15, p. 501-537.
- e TORRE ENCISO, E., 1953. Sobre una relación entre los tipos de disyunción de los granitos gallegos y su historia geológico-tectónica. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 1, e *Notas y Com.*, n.º 32, p. 1-31.
- PÉREZ MATEOS, J., 1965. Contribución al estudio de los arenales costeros de Galicia. III La costa norte de Carballo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 63, p. 63-69.
- e CARABALLO MUZIOTTI, L. F., Mineralogía de los arenales costeros de la ría de Cedeira (Galicia). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 67, p. 97-109.
- RAUMER, J. VON, 1962. Geología del zócalo cristalino de la península de Barbanza, cerca de Noya (La Coruña). *Notas y Com.*, n.º 68, p. 171-180.
- 1.ª REUNIÓN SOBRE GEOLOGÍA DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL (1965). *Leidse Geol. Meded.*, t. 36, p. 205-320. Leiden, 1966 (adicado somente aos traballos presentados na referida Xuntanza).
- 2.ª REUNIÓN SOBRE GEOLOGÍA DEL N. W. DE LA PENINSULA IBERICA (1967). *Comunicações dos Servíços Geológicos de Portugal*, t. 53, p. 1-171. Lisboa, 1969 (adicado por enteiro á dita Xuntanza).
- 3.ª REUNIÓN SOBRE GEOLOGÍA DEL NOROESTE DE LA PENINSULA IBERICA (1969). *Bol. Geol. y Min.*, t. 81, fasc. 2 e 3, p. 115-306. Madrid, 1970 (adicado por enteiro á dita Xuntanza).
- RICHTHOFEN, F. VON, 1886. *Führer für Forschungsreisende*. Berlín. 745 p.
- RÍO BARJA, F. J., 1956. El perfil longitudinal del río Jallas. *Bol. de la Univ. Compostelana*, n.º 64, p. 5-15.
- RODRIGUEZ BALTAR, C., 1966. Beneficiación de minerales densos de las playas de Galicia. Nuevas técnicas y dispositivos. Contribuciones a la 1.ª Reunión sobre Geología de Galicia y Norte de Portugal, *Leidse Geol. Meded.*, vol. 36, p. 305-318.
- SAINZ-AMOR, E., 1960. Estudio morfoscóptico de las arenas de la ría de Vigo. *Est. Geol.*, vol. 16, p. 35-42.
- , 1962. Estudio granulométrico de los arenales de la ría de Vigo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 60, p. 71-92.
- e AMORÓS, J. L., 1962. Composición mineralógica de las arenas de la ría de Vigo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 60, p. 177-194.
- SCHEU, E., 1913. Die Rias von Galicien; ihr Werden und Vergehen. *Zeit. Ges. Erdk.*, Habilitationsschrift, 40 p.

- SCHULZ, G., 1835. Descripción geognóstica del Reino de Galicia. Madrid. 52 p.
- SCHURTZ, H., 1902. An der Riasküste Galiciens *Deutsche Geogr. Bl.*, t. XXV, p. 50-70. Bremen.
- SORIANO, V., 1928. Arena circonífera de Vigo. *Mus. Cien. Nat. Barcelona*, t. IX, n.º 2.
- SOS BAYNAT, V., 1953a. Noticia sobre un Laboratorio de Geología de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 51, p. 147-152.
- , 1953b. El mapa geológico en relieve de Galicia del Dr. Parga Pondal. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.)*, t. 51, p. 153-156.
- , 1965. Geomorfología del valle del Louro, Ferríño-Túy (Pontevedra). *Bol. Inst. Geol. y Min. de España*, t. 76, p. 307-355.
- TELXEIRA, C., 1944. Tectónica plio-pleistocénica do Noroeste Peninsular. *Bol. da Soc. Geol. de Portugal*, t. IV, fasc. I e II, 26 p. Porto.
- , 1945. Algúns aspectos da geología dos granitos do Norte de Portugal. *Public. da Soc. Geol. de Portugal*, Porto.
- , 1946. Essai sur la Paléogéographie du littoral portugais au Nord du Vouga. *Petrius Nonius*, t. VI, fasc. 3-4, 28 p. Lisboa.
- , 1949. Plages anciennes et terrasses fluviales du littoral du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique. *Bol. Mus. e Lab. Min. e Geol. da Univ. de Lisboa*, n.º 17, p. 33-38.
- , 1952. Os terraços da parte portuguesa do rio Minho. *Com. Serv. Geol. de Portugal*, t. 33, 29 p.
- TORRE ENCISO, E., 1954. Contribución al conocimiento morfológico y tectónico de la ría de La Coruña. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 52, p. 21-51.
- , 1958. Estado actual del conocimiento de las rías gallegas. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 7. Publicado no libro "Homaxe a Ramón Otero Pedrayo", p. 237-250. Edit. Galaxia. Vigo.
- , 1962. Hallazgo de dos molares de mamut en una cantera de Buján, provincia de Lugo. *Trab. Lab. Geol. de Lage*, n.º 11, e *Notas y Com.*, n.º 65, p. 111-118.
- VIDAL BOX, C., 1933. La península de El Grove. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 33, p. 45-51.
- , 1941. Contribución al conocimiento morfológico de las cuencas de los ríos Sil y Miño. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 39, p. 121-153.



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific content can be transcribed.]

DISCURSO

do doutor

Don Isidro Parga Pondal

Académico Numerario

DISCUSSED

by

Benjamin Franklin

Author

Ilustrísimo Señor Presidente,

Señores Académicos:

O encárrago que recibín de todos vós, de responder en nome da nosa Real Academia Galega ao discurso que vimos de escoitar da autoría do Profesor Torre Enciso, énceme de ledicia e o seu honroso cumprimento e pra min ao mesmo tempo unha gratisima obriga de amizade cara ao recén chegado.

Xíngueme, nefeuo, a Don Uxío Torre Enciso unha anterga e endexamáis trubada amizade consolidada por unha laboura de colaboración de moitos anos. Non en vano fai máis de coarenta anos que sendo o que vos fala profesor de Química Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago, chegou á dita Facultade o señor Torre Enciso pra estudar a carreira de Ciencias Químicas, o que fixo con meirande proveito, sobresaíndo axiña como un dos mellores estudantes que eu tiña tido.

Dende entón, e por moitas razóns das que ocuparéime máis adiante, as nosas relacións científicas e de colaboración, e de xeito especial no campo da xeoloxía galega, foron moi estreitas.

Nacéu o novo académico nesta cidade da Cruña o día 12 de Santos do ano 1908. Eiquí abrironse os seus ollos por primeira vegada a ouservazón inquisidora da Natureza ao estudar as asignaturas de Ciencias nas que chegaría a ser experto mestre.

Xa bachiller trasladóuse a Santiago en cuia Universidade cursóu os estudos de Ciencias Químicas e Farmacia, merecendo sempre as máis outas calificacións, rematándoos co Premio Extraordinario.

Do seu paso pola Universidade, fálanos él mesmo ao lembrar o influxo que na súa formación exerceron os cadeirádegos Don César Sobrado, profesor de Mineraloxía e Zooloxía da Facultade de Farmacia, e Don Lois Iglesias, profesor de Bioloxía e Ciencias Xeolóxicas da Facultade de

Cencias. As explicacións destes mestres infruiron sen dúbida de maneira decisiva na orientación futura do novo académico.

Xa licenciado realizou en 1933 uns cursillos de selección pra profesorado de Ensino Medio, que tiveron lugar en Madride, e acadou a plaza de profesor de Cencias Naturaes nos Institutos Nacionaes de Monforte de Lemos e despois de Tui, pasando logo a expricar as mesmas disciplinas no Instituto Femenino da Cruña.

No ano 1940 acadou por oposición a cadeira de Cencias Naturaes do Instituto Femenino de Palma de Mallorca, pasando despois, polos correspondentes concursos, aos Institutos Femenino e Masculino da Cruña; de iste é, dende 1945, cadeiradego numerario de Cencias Naturaes.

Recentemente, no ano 1964, o profesor Torre Enciso foi distinguido co nomeamento de membro numerario do Instituto "José Cornide" de Estudios Coruñeses.

O novo académico leva, pois, máis de 37 anos adicado ao ensino, á mocidade galega, das leises que rixen e evolución dos fenómenos naturais. Sen dúbida, pois de elo estáo seguro, encóntranse hoxe eiqui algún dos seus antigos discípulos que lembrarán o moito que deben da súa formación ao ilustre cadeiradego e sentirán unha agradecida emoción ao presenciar o solemne acollemento que lle fai a nosa Real Corporación.

Ven nefeito o profesor Torre Enciso a ocupar unha cadeira de numerario na nosa Academia e aínda que por razóns de turno riguroso substitúe a un destacado xornalista, pode indudablemente considerarse como continuador de aqueles esgrevios académicos cadeiradegos tamén como il, e pertencentes a difrentes centros de ensino medio e superior de Galicia.

E agora desexo lembrar, aínda que samente seia mencionándoos, a os distintos profesores de Cencias da Natureza que sentándose nestas cadeiras foron os nosos honrosos devanceiros.

Xa no intre da fundazón da Academia noso primeiro presidente, o inmorrente Murguía, na selección dos homes máis sobresaíntes de Galicia sinalou varios distintos científicos pra ocupare sendos postos de número na nacente Academia.

Asín podemos lembrar agora entre os pertencentes a Sección de Cencias Naturaes a Don David Fernández Diéguez, cadeiradego de Ma-

temáticas do instituto da Cruña, que en 1925 deu lectura ó seu discurso de ingreso sobor do tema "As matemáticas na Apoloxética científica contemporánea", que causou grande impacto nos que o escoitaron na solemne sesión celebrada no Paraninfo do Instituto Xeral e Técnico desta cidade.

Máis recentes son Don Gonzalo Brañas Fernández, o sinalado investigador das ondas hertzianas, igoalmente cadeirádego de Física e Química no Instituto da Cruña, e Don Ramón Aller Ulloa, fundador do mundialmente famoso Oservatorio Astronómico de Lalín e profesor da Facultade de Cencias da Universidade de Santiago. Xa entre os actuais membros numerarios poidemos menzoar a don Lois Iglesias, ilustre profesor de Bioloxía, e ao numerario electo Don Enrique Vida! Abascal, esgrevio matemático galego, os dous cadeirádegos da Universidade de Santiago.

Mais a laboura do profesor Torre Enciso non queda circunscrita somentes á enseñanza.

Dende o ano 1953 colaborou directamente no programa de investigación xeolóxica de Galicia que dende xa facía algúns anos viña desenrolando o que vos fala como director do Laboratorio Xeolóxico de Laxe.

Torre Enciso ten nesta colaboración un posto destacado no progreso do coñecimento da xeoloxía galega e de maneira especial no estudo das formazóns recentes do terciario e cuaternario de Galicia e tamén dos procesos xeomorfolóxicos responsables da actual configuración xeográfica da Galicia.

Eu podo decirvos que dende 1953, e durante máis de 15 anos, Torre Enciso foi o noso compañeiro de excursións xuntamente co profesor Don Gabriel Martín Cardoso, tempranamente desaparecido, e co Doutor Inxenheiro de Minas, don Xoán Manoel López de Azcona, académico correspondente desta Corporación.

Xuntos recorreremos casamente todas as corredoiras, os vales e montañas galegas, recollendo os primeiros datos de observación directa que coidamos fundamentais pra facer unha cartografía xeolóxica de todo o antigo Reino de Galicia, e cuos resultados temos publicado, en parte, conxuntamente.

Axiña destacou Torre Enciso nestes traballos de campo como sagaz xeomorfolóxico, e os seus traballos de investigación sobor das Rías Galegas

e sobor dos procesos de alterazón das diferentes rochas graníticas existentes, acadaron un posto destacado.

E agora no seu discurso, vindes de comprobar a maestría e o dominio con que enfoca estes temas.

Ocúpase nefeito o profesor Torre Enciso, con gran precisión e aporte de datos, do estado en que atualmente se atopan algúns problemas xeomorfolóxicos de Galicia, ou seia, dos procesos que tiveron lugar nas épocas máis recentes da evolución xeolóxica do macizo galego.

E agora pidovos permiso pra unha pequena disgresión que coído necesaria.

Pra encadrar no seu verdadeiro marco xeocronolóxico os importantes procesos que precondicioan as atuais formas do releve xeográfico coído axeitado lembrar que estes procesos tiveron lugar únicamente durante os últimos 70 millóns de anos da longuísima historia xeolóxica galega.

Asegún as derradeiras investigazóns xeolóxicas, podemos hoxe afirmar que os primeiros sedimentos que orixinaron as rochas metamórficas máis antergas de Galicia, foron depositados nos mares da época precambrián, e aínda que non coñecemos a época exauta destes sedimentos, temos motivos pra supoñer unha idade de uns mil millóns de anos.

O que sí é xa un feito certo, é que as intrusións graníticas máis antergas, ben datadas en Galicia, ou sexa, os ortogneises da formazón que chamamos "O Complexo Antigo" teñen sido emplazados fai mais de 500 millóns de anos e son sin dúbida anteriores a oroxenia hercíniana.

Posteriormente ista oroxenia transformóu e metamorfoseóu todas as antigas formazóns, e os novos granitos herciniáns, emplazados moitos de eles a traveso dos sedimentos paleozoicos, fai uns 320, 300 e 280 millóns de anos, consolidaron e diron rixidez a todas as estroituradas máis antergas dando orixen ao que hoxe chamamos o Macizo ou Bloco Galego.

Dende esta derradeira data, ou sexa, dende fai 250 millóns de anos, Galicia constituindo un cratón ou bloco rixido emerxente sobor das augas dos grandes mares epicontinentales do mesozoico, non volvéu a recibir novos sedimentos terríxenos, hastra as épocas relativamente recentes do terciario e do cuaternario, e aínda nestas épocas en cantidade moi pequena i en rexións moi restrinxidas.

Todos os complexos procesos de que nos fala Torre Enciso son pois unicamente, o último eslabón de unha longa cadea de acontecementos extremadamente lentos no seu desenrolo, e cuos resultados apenas poden notarse si tentamos medilos coa escala da vida humán. Trátase nefeuo de procesos lentísimos pro que actuando de forma continua, como a gota de auga, chegan a producir meirandes efeutos.

Con bon acordo divide o profesor Torre Enciso o seu discurso en tres capítulos fundamentaes que adica a outros tantos problemas da xeomorfoloxía galega, que il coñece de modo exhaustivo por terlle adicado importantes investigacións orixinaes.

Enfoca en primeiro lugar o problema da meteorización do rochedo, baseándose na acción diferencial, xa de un mesmo clima ou xa dos climas difrentes e cambiantes dos derradeiros períodos xeolóxicos sobor de gran variedade de rochas cuo resultado e o feiticeiro paisaxe galego e cuia xénesis pon en evidencia de modo maxistral.

Ao se ocupare, despóis, do desenrolo das superficies de erosión fai insistencia na variada historia, epiroxénica dos difrentes blocos en que se atopa dividido o macizo galego, feito iste que contribuíe a aumentar a diversidade do paisaxe e cuia complexidade exprícanos o autor de modo exhaustivo ao mesmo tempo que pasa revista aos máis importantes estudos adicados a istes problemas polos autores máis modernos, e tamén aportando novas ideas orixinaes que fan do seu discurso un seguro inicio de novas investigacións sobor destes apaixoantes problemas.

Ocúpase derradeiramente do difícil problema dos orixes das Rías Galegas, tema iste amplamente debatido dende fai máis de cen anos polos especialistas da Cencia Xeomorfolóxica, e nos que o profesor Torre Enciso e, sin dúbida, unha autoridade cuia aportación xa non se pode descoñecer. Así vemos nefeuo que os seus traballos, sobor da Ría da Cruña (1954) e sobor de conxunto das Rías Galegas feito en 1958, son constantemente consultados polos especialistas.


No resume que nos ofrecéu recollendo os derradeiros traballos de Nonn, Pannekoek, Teixeira, Birot, Solé Sabarís, e outros, aporta análogamente ouservazóns de grande intrés sobor dos climas extremos de calor e frío, chuvias e sequías polos que pasóu Galicia nos derradeiros períodos do cuaternario e do terciario, e recalca a súa importancia no problema do orixen das rías xuntamente coas accións de fraiturazón e erosión diferencial.

O profesor Torre Enciso tivo ademais a difícil habilidade de facer ameno un tema verdadeiramente árido e tamén de por si extremadamente monótono si se considera como un desfile de movementos pendulares, cifras, climas, rochas e procesos, en xeral moi análogos a os ollos evidentemente profanos da maioría que nos escoita.

Por todo, pois, desexo dar as gracias ao profesor Torre Enciso en nome de todos os meus compañeiros de Corporación e tamén, atrevome a decilo, en nome de todos vós.

Sexa benvido ao seo da Real Academia Galega o novo académico numerario o profesor Don Uxío Torre Enciso.

Teño dito.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the paragraph or as a separate section.


Fourth block of faint, illegible text, appearing as several lines.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the paragraph.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as several lines.

Seventh block of faint, illegible text, continuing the paragraph.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



REAL AC
GALE
A COR

294

Biblio



MADE IN
REGA
ORUN



tote